

1820

MSS 919 (19)
Amor en el pecho
de pecho

Observadores D Antonio del Barco y D
Mariano Livent
Censor D Sebastian Aro Fraviero



19 y 26 de Octubre

87 - 4. A. en 8

A. 702 - 733

BH MSS 919 (19)

Faint handwritten text at the top of the page, possibly a date or recipient information.

Handwritten text in the upper middle section, appearing to be a name or address.

Handwritten text on the left side, possibly a date or reference number.



Vertical handwritten text or markings running down the center of the page, possibly a name or address.



7
D^{ña} Josefa de Arce, de edad de quarenta y
do años, robusta, y bien completada, sin falta
de los periodicos, Temperam^{to} Sanguineo-Viloso, hace
unos quince dias senos presento con un tumor
duro, e indolente de la magnitud mas que de
un huevo en el pecho derecho, situado en la
parte alta, y media, cuyo tumor mortifica
entre dia, ya con algunas punzadas, ya otras
veces con crezor, y en especial en el peron, el q.
está contrahido, la parte con alguna desigual-
dad, el color algo apartado de lo natural incli-
nado à livido, y las Venas varicosas asu circunfe-
rencia &c. Dicho tumor, por relacion de la En-
ferma, ya pasa de dos meses que lo estaba obser-
vando, pero sin incomodarle; dicha enferma
dice no acordarse haver tenido golpe alguno
en dicha parte.

Por los sintomas referidos lo gradua-
mos por un cancer oculto, e incipiente.

El metodo adoptado para su curacion
hasta de presente es como sigue:

Se le adiaró con una dieta nutritiva
acompanada con las tisanas aperitivas, y Sapo-
narias, y sales alcalinas, y a cierto tiempo su

la gante; despues de este, y ademas de lo dicho
le hemos administrado, y está tomando al acor-
tarse y por la madrugada, el extracto de Sienta
ceha pildoras, sin aplicar ningun topico a la
parte, mas que precaverla de las inelencias
del tiempo, y desde entonces no se ha observado
novedad alguna, en aumento ni disminucion
en dicho tumor.

Es quanto se ha practicado, y esperamos
mas el parecer de los S. a quienes esta Relac-
cion se dirige y presente. La Roda y
Marzo 1.º de 1820.

Antonio del Barco
Cirujano


D. Mariano Sivert
Medico

89-4-7-2008

1820

No 492

Consulta



Una Señora de cincuenta y tantos años de edad, de temperamento bilioso y arido, soltera, recogida, yeno de vida laboriosa, padece muchos años ha una afecion histérica, y en ciertos tiempos padece tambien dolores cefalgicos, calores en los pies, en las espaldas y en la parte anterior del pecho. Hava cosa de quatro años cesó de menstruar, y de do^{ve} á tres años que tuvo una vehemente melancolia.

Despues de algunos meses se encontró con un tumor duro en la circunferencia de la mamilla del pecho derecho que interesa la glandula mamaria: un tumor chato, algo desigual, un poco elevado, y rubicundo por la parte esterna. La mamilla, tambien rubicunda, estaba un poco escoriada, con una pequena costra arrazando materia purulenta y fetida. Siempre sintió algunos dolores punzantes.

Hace dos meses (Junio de 1819) tomó baños en su propia casa; y con uso, y con el uso del Saturno y cataplasmas de meapanis en la parte cesaron los dolores, cicatrizó la llaguita y desapareció la fetidez.

Tomó tintura de quina aguada con acido sulfúrico, precediendo á este medicamento un purgante de Alois calamolano. Despues de usar de la tintura por espacio de 8 dias, repitió la purga, con la q. obró poco y arrojó dos bombas redondas.


Por lo q. hace al tumor se le ha aplicado unguento mercurial, lavandole dos veces al dia con agua de cal, en una libra 10 granos de sulfurate de potasa. Ha seguido este ultimo metodo unos 15 á 18 dias; y en los 8 dias ultimos se nota el cutis nuevam^{te} escoriado (lo que puede ser efecto del unguento y del agua de cal) en la mamilla y parte rubicunda del tumor: arroja alguna serosidad clara

y sin fetidez, y de vez en quando vuelve a sentir los dolores punzantes.

La magnitud actual del tumor es de un peso duro de circunferencia y dos de grueso, y solo se eleva en el sitio arriba indicado: es algo desigual, esta sensible al tacto, y parece un poco adherido a la 5.^a costilla?

No hay mas infarto en glandula alguna externa, pero siente dolor en la parte enferma y brazo q.^{do} hace con este alg.^{no} movimiento que exige fuerza.

La sra. es de poco comer, padece frecuentes debilidades, y esta algo afectada o escorbuto en las encias; no tiene otro virus dominante. Ha sido siempre muy casta y honesta.

Se pregunta pues qual de los dos metodos debe seguirse con preferencia, o en su defecto qual sera mas adecuado a la naturaleza del mal y al temperamento de la enferma; y se ruega al Sr. profesor que estienda la contestacion a esta consulta que use de franca libertad en la critica de los dos sistemas de curacion seguros hasta el dia, y con la misma dicte el mas conven.




87 - 1 - 8 - N° 733

Dictamen á la consulta leida en el Colegio Nacional de S.ⁿ Carlos el jueves 21 de Octubre de 1870.

Una S.^{ra} de 40 á 60 años de edad, temperamento bilioso, y arido, settera, de oida recogida, y laboriosa, padece muchos años ha histerismo, cefalalgia, calor en los pies, espaldas y parte anterior del pecho: la menstruacion la cenó hace como cuatro años, cayendo en una vehemente melancolia havá 2 ó 3.

Despues de algunos mesy observó un tumor duro en la circunferencia de las axilas del pezon del pecho derecho, el qual interesaba la glandula: tumor duro, repito, chato, desigual, y rubicundo; el pezon tambien estaba rubicundo, escoriado un poco con una pequena costra, arrojando materia purulenta, y fetida con algunos dolores punzantes.

En Junio de 1870 tomo banos caseros con los

quales, y la aplicacion de las cataplasmas de
vegeto, cesaron los dolores se cicatrizó la llaga
ta, y por consiguiente cesó el flujo fetido.

Tomó la enferma tintura de quina p.
ocho dias, precediendo á ella unas pildoras de
aloe, y calomelanos, cuyas dosis se callan,
q. correspondieron con la idea de mover
el vientre; y arrojó dos lombrices redondas.

Al tumor se aplicó posteriormente,
una ventura del unguento mercurial, la
banda dos veces al dia el pecho con una
agua de cal en la q. havian disuelto
diez granos de sulfate de potasa p. libra;
creo seria carbonato; á los ocho dias de
este metodo se notó el cutis nuevamente
escoriado, lo q. se atribuye á la ventura,
ó á el agua de cal, cuya escoriacion cor-
responde ala mamilla y partes rubicun-
das del tumor; arrojando alguna serosidad
fetida; y sintiendo alguna vez dolores pun-
zantes.

El diametro del tumor era como de un

duro, y su tamaño proporcionado, desigual, y del
grueso de dos cantos de duro, está sensible al tacto,
y como adherido a la quinta costilla.

Se pide el remedio para la curacion de
esta enfermedad; y el dictamen sobre los méto-
dos empleados.

Dictamen.

El extracto de la consulta precedente, q^{ue} es ca-
si la copia literal del escrito, p^{er} ser este muy
conciso, da á entender lo difícil q^{ue} es determinar
si la enfermedad es un escirro, ó cancer imm-^{te};
si atendemos á q^{ue} es un tumor duro, q^{ue} ocupa
la parte de una glandula conglomerada
muy interesante, qual es la del pecho, acom-
pañado de dolores punzantes, podriamos decir,
q^{ue} era un escirro perfecto en el q^{ue} amonaza
la degeneracion del cancer; mas no consta
la dureza esquivita, q^{ue} deben tener estos tu-
mores. Por una parte se dice en la observa-
cion, q^{ue} este tumor es del diametro de un du-
ro, y de grueso como el canto de dos duros,

y no hace caso del volumen de la dureza, q^d dijo tenia en el pecho; y en este caso parece, q^d solo los tegumentos son los interesados; añade a esto, la facil rubicundez q^d adquieren los tegumentos ya sin causa manifiesta ya con la aplicacion de remedios, q^d aunq^d suavez, le irritan, siguiendose en ambos casos ya de irritacion, ya de no irritacion, una ulcerita hacia el poron, q^d arroja un fluido fetido. Si atendemos al tiempo q^d padece la enferma el tumor, ya su resistencia en ceder algo á los cortos auxilios, q^d se le han aplicado; parece q^d unidoz todos estos fenomenos morbosos, podemos deducir q^d este tumor se inclina mucho á un escirro, quizá imperfecto, pero q^d tiene cierta tendencia á degenerar en cancer. Por consiguiente el diagnostico; y pronostico debe ser reservado.

Y suponiendo esto, ¿quales remedios deben aplicarse? aquellos, q^d la racion,

y experiencia nos hayan acreditado de mejor éxito: los fundentes calmantes, son los q. han estado en gran voga, la cicuta, el acónito, y otros de este jazer; y particularmente, la primera; pero no siempre nos han dado los resultados apetecidos; otras veces fundentes algo estimulantes han correspondido mejor en la practica, tal es el carbonato de potasio, ó sal de tartaro. (sub-deuto-carbonate de potasio).

Estos remedios se han usado ya interior, ya exteriormente, ó de amboz modos á un tiempo: para lo qual es necesario no olvidar la constitucion de los enfermos, p.ª guiar el feliz resultado en la variedad de ellos habria consistido en la diversidad de temperamentos poco observados p.ª algunos practicos.

He visto en semejantes tumores empezar á disminuir con el largo y prodigo uso interior del extracto de cicuta, p.ª llegar los tumores á cierto grado, q. no iban á detras ni ade-

lante; p.^o cuya razon suspendiendo
aquel heroico remedio, empezar á usar de
la sal de tartaro, ó carbonate de pota-
sa disuelto, ya dosis proporcionadas,
an interior como exteriorm.^{te}, y las
enfermas haverse curado sensiblemente;
de lo qual tengo algunas observa-
ciones.

Por consiguiente reuniendo todo
lo dho. soy de opinion, q.^e este tumor
puede caracterizarse p.^o un escirro im-
perfecto con tendencia al perfecto, ó can-
cer: que en atencion á la irritabili-
dad, y sensibilidad de q.^e debe estar do-
tada la enferma p.^o la ligera intima-
cion, q.^e se hace de su temperamento
puede empezarse á usar del extracto
de cicuta emmaridado con qualquiera
de las preparacionez del hierro mas ana-
logas á su constitucion; y en la parte
vn emplasto del espermá de Ballena,

ó otro analogo, ó bien las cataplasmas de la
misma especie: usando tambien al mismo
tiempo de algun otro tónico amargo p.^o q.^o sos-
tenga las fuerzas de la enferma.


Si á pesar de estos remedios la enfer-
medad no disminuyere, entonces se puede
aconsejar la administracion p.^o lo interior
del carbonato de potasa, ó sal de tartaro;
con lo q.^o el mal debia ir cediendo: mas
si á pesar de esto el tumor ~~viciarse~~ progresa,
aumentandose los sintomas sospechosos, de-
be pasarse á la separacion del referido tu-
mor; debiendo los profesores tener presente
en todos tiempos el fluido fetido, que de quan-
do en quando arroja la enferma p.^o el pe-
zon, pues siempre es agüero muy respetable.

Los demas ^{trascidentes} ~~remedios~~ q.^o toca la consul-
ta no son de mi proposito; p.^o consiguien-
te no hallandose en la observacion in da-
tor suficientes p.^o juzgar la conducta de

los profesores, q^e la han tratado; mi in-
cienia suficiente en mi para decidir
sobre la opinion de otros, me absten-
go en el juicio.

Los profesores, q^e componen esta
sabia junta muy ilustradoz podrian
decidir sobre asunto tan delicado, y
corregir la opinion, q^e sobre la presen-
te consulta he manifestado.

Madrid y Octubre 26 de 1790.

Sebastian Ayo
travien. 

Las demas s^{ras} hicieron reflexiones
oportunas p^a ilustrar a los discipulos
conformandose con el dictamen del con-
102.



Antonio
frio 