

1817

MSS (37)  
Cirugia.  
Amor a Patria

Observador — Dn Jose Arias  
Censor — Sr de Ribes



10 y 17 de Abril

87-4-A = n° 7

N. 646 - 647

(25)

BH MSS 918(37)





Ensayo Cathedratico del M.<sup>o</sup> Colegio de Cirujia de S.<sup>o</sup> Carlos de Madrid:

D.<sup>o</sup> Ignacio Torras. Cirujano Titular de el Rey y Partido de las Alpuj.  
 en la Prov.<sup>a</sup> de Lorica Expone lo siguiente.

Un Caballero de edad de 30 años robusto y bien constituido en la Ape-  
 riencia, se le Presento en el mes de octubre del año de 1815. un tumorcito de Caracter Linfa-  
 tico y de la magnitud de una Abellana, sobre el tercer falange del dedo medio de la mano  
 derecha, con esta Indisposicion y sin Precaucion alguna, Viajo p.<sup>o</sup> el espacio de 15 dias a el  
 Pais de Bhemadura sin Incomodidad, a Pocos dias de su Arribo fue acometido de un  
 fuerte dolor q.<sup>e</sup> produxeron una supuracion de mala Indole e Inmediata. se sudicauo  
 la Carie en dho. 3.<sup>o</sup> falange: el facultativo a quien confio su Curacion, Procuro la Exfolia-  
 cion por q.<sup>o</sup> Medio Alcanfor su saber. lo dio por curado a Vltimo de Mayo del año q.<sup>e</sup>  
 a finalizado. Ingresado dho. Caballero a este Pais, y siendo q.<sup>e</sup> dho. dedo continuaba supu-  
 rando un Puy Casoso y confoso, y creciendo la Infeccion de Color Violado y algunos forame-  
 nes Pequeños Inmediatos a la Ulcera me hizo llamar, y reconocido con la sonda ademas de  
 lo de Santhomas Espus. ady. Encontre la Aguijera del hueso en la Mayor pte. del 2.<sup>o</sup> falange, le  
 aconseje la Amputacion por la 2.<sup>a</sup> Articulacion, la q.<sup>e</sup> Practique en 24 de Mayo y el su-  
 ceso correspondio a mis esperanzas pues en la Direccion hallé un Verdadero Necrose en toda  
 la Extension de dho. falange y muy Inmediato a la Articulacion 2.<sup>a</sup> Curso Radicalm.<sup>te</sup> en poco  
 tiempo:

Este como veinte dias poco mas o menos antes de salir de Bhemadura q.<sup>e</sup> seria en prin-  
 cipio de Abril del año pasado, advertio una sensacion dolorosa y con algun Volumen Tu-  
 moroso sobre la pte. media y posterior del humero del brazo del dedo afecto, hizo me comu-  
 nicar esta Nueva Indisposicion p.<sup>o</sup> el mismo Profesor q.<sup>e</sup> le curaba su dedo, quien le aconse-  
 jo unas fricciones Resolutivas y se Pusiese en camino, asi lo hecuto, y reconocido p.<sup>o</sup> mi  
 pte. cuando el dedo, hallé formado un Tumor de Caracter Linfatico Nada doloroso y de la  
 Magnitud de un huevo de Gallina pero Apl. anado sin Mutacion de Color en la Piel, situa-  
 do en la pte. media de dho. humero y Musculo Brachial hterno, advertiendo q.<sup>e</sup> el Tumor  
 q.<sup>e</sup> contenia dho. Tumor en la Compresion q.<sup>e</sup> se hacia Retrocedia p.<sup>o</sup> toda la Direccion  
 de este Musculo hta. su pte. superior. Considerando debia Procurar la Resolucion de dho.  
 Tumor Por todos los medios q.<sup>e</sup> el Arte Prescribe, y q.<sup>e</sup> lo primero q.<sup>e</sup> debia satisfacer eran  
 los Sintthomas Inflammatory. Mandé Aplicar un buen Paquete de Sanguietas, y a muy  
 Pocos dias de Aplicado este Medicam.<sup>to</sup> Practique la Amputacion al dedo. con la Eva-  
 cuacion Sanguinea q.<sup>e</sup> produjo la Operacion y la deley dho. Sangre como ya e<sup>o</sup> insinua-  
 do y la Tumor, logro disminuirse p.<sup>o</sup> virtud el Predicho Tumor. Luego q.<sup>e</sup> el Enfermo  
 Empero hacer algun Exercicio Especialm.<sup>te</sup> el de Puntar la Viruela, recibio mas Porcion  
 de Sangre y se aumento lo tumoral sin dolor ni Otro Sintthoma, Me pte<sup>o</sup> Otro Paquete  
 de Sangre y Antes de Estas despues de deley Taboncillos Amoniacales Compuestos en fric-  
 ciones, de las Cataplasmas de Sal de Tartaro, deley Corrolorantes Resolutivas echas con los  
 Binos Aromatizados, de las fricciones y Topicos del Aguad.<sup>o</sup> comun. Alcohol y Espiritu  
 de Romero disolviendo en estos Espiritus el Alcanfor, Sal de Tartaro y Amoniaco,

Precediendo a los Medicam<sup>tos</sup> las Irigaciones de Agua Caliente con las mismas sales. amas  
un Vendaje de Framela con sus compresas y alas p<sup>tes</sup>. laterales del Brazo medianam<sup>te</sup> con  
primido. Los Medicam<sup>tos</sup> resolutivos los administree con el fin de dar tono y Accion a los  
vasos q<sup>e</sup> dearrumaban la linfa y procurar su Absorcion, por la Debilidad q<sup>e</sup> loprimamente  
tenian, pues siendo este sujeto Abundante en segregar linfa segun Presenta su Carac-  
ter y el de Aber padecido Algun Dolor Artificio Vago, con may una Enfermedad Aguda  
hace quatro o cinco años sin q<sup>e</sup> p<sup>ra</sup> esta Vbiere cedido la Citada Artificy sinthomas p<sup>ra</sup> lo  
cuales me hicieron sospechar tomada q<sup>e</sup> fue esta Indicación, habia algun sello en la  
masa G<sup>ral</sup> de los líquidos o mucha Abundancia de dho. humor linfatico y q<sup>e</sup> este fu-  
ese la Causa de q<sup>e</sup> los Vasos Galantes Vertiesen tanta Porcion del Citado humor en el Bra-  
zo Afecto, y la falta de Accion tonica en los Vasos Absorventes diese lugar a la Estan-  
cacion y de aqui el Tumor: Por cuyo concepto hice Pasar ael Enfermo a los baños mine-  
rales de fitero, de cuyas Aguas hizo uso en baño y bebida, y ael dho. Brazo Afecto hi-  
ce solo embarrarse con el Lieno de dhas. Aguas y tomase las Irigaciones por espacio de  
Nuebe dias, resultando del uso de este Medicam<sup>to</sup>. Varias Evacuaciones de transpiracion  
Camarax y trina q<sup>e</sup> pusieron mas Agil ael Enfermo y sus humores segun Manifesto  
el estado de su Pulso. Precedido este remedio G<sup>ral</sup>. como hebo copresado y viendo la  
Persistencia q<sup>e</sup> el d<sup>cho</sup> humor ofrecia a la Resolucion, su Aumento por la ma-  
yor copia de humor q<sup>e</sup> en el se Acumulo y la Mayor fluctuacion cuing<sup>te</sup> sin mu-  
dacion alguna en el Color de la Piel, en Consulta Verbal con D<sup>no</sup>. Pedro Andana Ci-  
rujano Fiel de la Ciudad de Ovella, Profesor de Cirugia y Hereditada Practica,  
de Acuerdo Abria dho. Tumor, lo q<sup>e</sup> Execute en 3 de Agosto del año Pasado. en la  
Apresion Abria Dilate todo el hogax q<sup>e</sup> formaba el Tumor, el líquido q<sup>e</sup> contenia  
era de Consistencia linfatico con algo de Meliceris. Incluido entre el Tejido Celular  
y los musculos los q<sup>e</sup> Aparecieron Nestos. Observe una Caperna alo dargo del dho. o.  
la Mayor p<sup>te</sup>. del Musculo Praxial q<sup>e</sup> terminaba muy cerca de la Cavera de Mu-  
mero la q<sup>e</sup> no Turque como se Dilatar med<sup>te</sup> el Vng<sup>to</sup> Vicio q<sup>e</sup> de materiales, Pre-  
sentaban y, respecto a la Articulation p<sup>ra</sup> la Grande Abertura q<sup>e</sup> habia q<sup>e</sup> hacer. In-  
mediatam<sup>te</sup>. Aplique una Compresa Doble en toda la direccion del seno. o. tenida de  
un buen Vendaje Copulsivo de Framela q<sup>e</sup> bayaba dando Espaciales d<sup>ta</sup>. muy cerca del  
Cubito. Hecho del fin de deliterar los Vasos y p<sup>ra</sup> Aplanam<sup>to</sup> adherido este mi Methodo  
a el sistema de Benjamin Bell. en su Tratado de Uceras:

A la Abertura o. Ulcera reciente. Aplique los Digestivos Balsamicos bien  
primados y amuy breves dias suspenda su uso. Instituyendo alguna Tricecion ya Bal-  
samica ya Adstring<sup>te</sup> ya Guinadas, con las Precauciones enq<sup>ta</sup> ael uso de este remedio  
q<sup>e</sup>. Mr. G<sup>ral</sup>on Dicta en el mismo Tratado de Uceras de Bell: siendo el Procorua  
Jerial q<sup>e</sup> copelia la Ulcera y subuena Calidad, desprecie todo Medicam<sup>to</sup>. Aplicando  
la Masca adha. Ulcera y Vendaje preferido q<sup>e</sup> adopto mi Acompañado Andana:

El Plan Interior de Medicinas q. en esta Epoca Usaba el enfermo, y q. estubo haciendo uso por  
Espacio de Cuarenta dias, fue los Cocim<sup>tos</sup>. Venenos Dulcificados, la Tigarana q. trae Plene.  
del folio 479. dos de acapantes y Vichy Macho Propio asu Estado. hasta el mes de Nov.  
siguió el enfermo robusteciéndose mas y mas, sin hopenmentar dolor Articular ni la  
ra Incomodidad, la Ulcera en el mejor Estado de simple Pusulenta Venandose de Carne  
fiamey. pero el Pus en esta Epoca Vario de Consistencia, siendo mas Craso, Inesistente  
con bastante fetor y tinturara los Apositos de un color Moreno Obscuro. Cuyos Sintomas  
mas me hicieron sospechar el Curio q. Afectaba ael hueso; Consultado este Nuevo Sin  
thoma ael Expressado Profesor Andamari. fue de sentia con mi Dictamen, q. en Atencion  
ala Poca Cantidad de Pus q. hopenlia la Ulcera pues solo curando de Cuatro cinco seis y  
mas dias, solo contenia un Poco de Podre la Planchuela q. Mezumaba ael laberal, se  
Usase en form<sup>a</sup> ala Predicha Ulcera de un Cocim<sup>to</sup>. Quincado dien cargado de Camfora y sal  
Amoniaco y su Vendase hopenlió, y hta. no observan mayor Aumento de Sinthoma,  
obrae Praxida Naturalera como sabia en la hopenlión q. por si sola hace muchas  
vees hopenliendo lo q. le es Noctivo.

El Estado Actual de este Paciente es, seguir hopenliendo por la Predi-  
cha Ulcera el Pus con las Cualidades Expressadas de fetor Negricante q. en la Cantidad  
no ay Aumento. Sondeado con todo Cuidado de Cuya Operacion no se Abusado, se obser-  
va q. la Primera Caverna q. se dirijia p. todo lo largo del Musculo Braquial hopen-  
na, se halla obliterada en la Mayor pte. de su diametro, y solo ay una q. desde la  
Ulceras q. esta, esta situada en la pte. media y posterior del humero, se dirije en figu-  
ra oblicua hasta el Principio del Deltoidey, por donde sin duda baja el Podre. con la  
sonda no se observa Apenes en el hueso, pues solo se puede conducir, esta por entre  
el Tejido Celular y los musculos. Med<sup>a</sup>. el Ning<sup>o</sup>. Aumento de Sinthomay q. el enfermo  
se halla robusto de buen color. Alegre Diverido, sin Ning<sup>o</sup>. Pasion de Animo, Co-  
me con Apetito Duermey y hopence todas las demas funciones con Comodidad y Delite  
no tener seguridad donde se hallara el Curio, y el Respeto q. aun Profesor ofrece pa-  
ra hopenar una Articulacion sin una Grande Necesidad, son Motivos, Poderosos p.  
los cuales no se Pondra en Ejecucion Operacion alguna hta. q. la Bondad de Voz. como  
Espera el Consultante, tenga tambien Decia en su sabio y Acreditado Dictamen q.  
sea de su Acuerdo en Respuesta aeste Torco y cansado Prelato, Disimulando su po-  
ca finura puesto q. mi Ingenio no Alcanza may, y si desea, aben p. bien ala he-  
manidad. ael mismo Tpo. Supp<sup>co</sup>. a Voz. p. la satisfaccion de los Interesados de este en-  
fermo, si el Methodo de Curacion q. se a observado con el Ardo Methodico, haciendo  
nos el favor a que nos Acredita Vro. Merito en este Particular, Decia su sentia  
con lo Demas q. Turquen Comb<sup>te</sup>. Respondiendo con la Mayor brevedad;  
Doy Gue. a Voz. m<sup>pa</sup>. como lo desea p. bien de la Salud Publi-  
ca, su Apasionado Discipulo. J. S. M. P. Ignacio J. J. J.  
Castellano Febrero 10 de 1817.

2022

87-4-A-w'7 N 0646



En el Jueves proximo pasado se leyo una consulta remitida de Castelfrío Provincia de Soria, por su Cirujano titular D<sup>n</sup> Ignacio Frías, que extractada dice lo que sigue:

Un Caballero de edad de 19 à 20 años bien constituido à la apariencia, advirtio en el mes de Octubre de 1815 un tumorcito de caracter linfatico de la magnitud de una avellana sobre el tercer falange del dedo medio de la mano derecha: viajó por espacio de 15 dias sin incomodidad, y à pocos de haber concluido su viage fue acometido de fuertes dolores que produjeron una supuracion de mala indole, à la que siguió la caries de dicho falange. El cirujano que asistió al doliente se valió de los medios que conocia para lograr la exfoliación, y lo dio por curado à ultimo de Marzo del año 1816. Volvió à su país, y el cirujano que remite la consulta advirtio que el dedo supurado, y que el pus era craso y con fexor, dicho dedo estaba inchado, de color violado, con algunos agujeros pequeños, é inspeccionado por la sonda encontró asperera en la ma-

yor parte del 2.<sup>o</sup> falange; inmediatamente se le aconsejó la amputación por la segunda articulación, que practiqué en 2.<sup>a</sup> de Mayo, y curó radicalm<sup>te</sup> en poco tiempo: inspeccionado el 2.<sup>o</sup> falange hallé que padecía un verdadero necrosis hasta muy cerca de la articulación.

Antes de operar al enfermo le advertí un tumor en la parte superior algo externa del brazo del dedo afecto de la magnitud de un huevo de gallina algo aplanado, de caracter linfático, que contenía un fluido que se retiraba acia la parte superior quando el tumor se comprimía. Creí yo que debía procurarse la resolución, y para conseguirla se propuso calmar los síntomas inflamatorios á beneficio de dos paquetes de sanguijuelas aplicadas al tumor en distintos tiempos, advirtiéndole que la pérdida de sangre durante la operación del dedo pudo también haber contribuido al fin, por cuyos medios disminuyó la mitad del tumor. Vió despues de todos los resolucivos estimulantes que conocia, pero sin fruto. Sabiendo que el paciente había padecido de



lores vagos artríticos, y una enfermedad aguda  
sin alivio de estos, determino paucase á Firero donde  
se bañó, bebió las aguas, embarró el brazo, y tomó  
los chorros, pero el tumor al menos de volumen  
y la fluctuacion se hizo mas sensible. Viendo la  
resistencia de la enfermedad, consultó con otro ciru-  
jano, y unanimes determinaron la abertura del  
tumor que se executó en 3 de Agosto: la incision  
comprendió todo el hogar (cui se explica el con-  
sultante) que formaba el tumor, y el fluido era  
linfatico: observo una caberna que terminaba  
cerca de la articulation superior, que no tubo por  
conveniente <sup>abrir á causa de</sup> estar muy cerca de la cabera del humero: aplico  
una compresa doble, y vendage de franela, y á  
la herida digestivo balsamico animado, y en segui-  
da, varias inyecciones de la misma naturalera.  
Por estos medios mejoró la ulcera, y aplico hilare,  
cas y el mismo vendage. Pasados quatro meses de  
este tratamiento, en cuyo tiempo el observador llenó  
el estomago del enfermo de tisanas de varias especi-  
es, se advirtió que el pul salia algo fetido, y more-  
no, tinteando los apósitos de un color obscuro; y

sin embargo de no encontrar aspersiones por me-  
dio de la sonda, cree la existencia de la caries.  
pero atendiendo á las buenas disposiciones que pre-  
senta el todo del sujeto, y que tampoco sabe á  
punto fijo el sitio donde el hueso está mortificado,  
respetando igualmente la articulacion del hume-  
ro: no se atreve á practicar operacion alguna,  
hasta que los Catedraticos de este R. Colegio la  
determinen, y al mismo tiempo pide que digamos  
si el metodo que ha seguido es racional, ó suscepti-  
ble de alguna mejora.

### Dictamen

Mucho tendria que decir si me parare un poco en  
meditar lo ocurrido, tanto en el tumorcito del de-  
do desde su principio hasta la fatal execucion  
de amputar, como en la larga carrera de sinto-  
mas que se han notado en el tumor del brazo, has-  
ta la epoca presente en que se propone por el obser-  
vador una operacion en la articulacion superior  
del brazo, sin decirnos qual deberia ser. pero como  
lo que mas me pertenece sea arreglar los medios  
de curacion que deberan seguirse en adelante:

me ceñire en este asunto, tocando solamente de  
paso algunos puntos que ilustrados por mis diestros  
compañeros, no dexaran de ser utiles à la Juventud  
facultativa, que viene aqui para instruirse.

Aunque la podre de color obscura no sea un  
signo característico de la caries, sin embargo  
hay en nuestro enfermo suficientes motivos pa-  
ra asegurarla; tales son; la facilidad con que  
se formó en los falanges del dedo amputado,  
las varias y repetidas aplicaciones en la ul-  
cera de sustancias irritantes, la fácil y conti-  
nua introduccion del ayre en el fondo del  
seno, y el uso interior de remedios que bien le-  
jos de vigorizar el todo, son muy capaces de  
aflojarlo.

Supuesta la caries, y no conociendose más <sup>que</sup> <sup>ligeras sospechas</sup>  
vicio que pueda fomentarla que la <sup>ligeras sospechas</sup> <sup>interrupcion</sup>  
del <sup>vicio</sup> algunos dolores <sup>artiricos</sup>, pondria al enfer-  
mo en el regimen sigte: un plan tonico interi-  
ormente con algunas pildoras de la goma de

guayaco, ejercicio al ayre libre, curaciones  
raras y sencillas, valiendome para ellas de  
varios remedios segun el <sup>condor</sup> estado de la ulce-  
ra y de los regimientos que la rodean. El  
estado inflamatorio se cuidara con los emoli-  
entes, anodinos, y sangrias locales si los prime-  
ros auxilios no bastasen. La Debilidad y ten-  
dencia a la putrefaccion exigen los anticep-  
ticos, no en forma de inyecciones que raras ve-  
ces aprovechan, sino en forma de fomentos,  
o aplicaciones en polvos. Finalmente, la fal-  
ta de accion se debera socorrer con tonicos es-  
timulantes. Dichos remedios, un bendeage bi-  
en aplicado, y el tiempo necesario podran ser  
muy capaces de ayudar a la naturaleza pa-  
ra efectuar la exfolian, obra muy exclusiva-  
mente.

Por tanto, no solamente no hablo de amputa-  
cion del brazo que considero temeraria, pero

ni creo deba ejecutarse la mas minima  
operacion, por los motivos que vienen indi-  
cados.

En quanto al procedimiento facultativo que  
ha observado <sup>del</sup> del principio, solo me diré que  
es bien raro no haberse acordado, supuesto ha  
sido discipulo de este colegio, de los preceptos q.  
ha oido, pues bien observados es muy regular  
que el paciente no hubiese perdido el dedo, ni  
que se hallase en la actualidad con una dolen-  
cia tan grave, que si no cuida como correspon-  
de, podrá quitarle la vida.

N.º 17 Abril de 1817.



José Ribes  
C.





