

Del Colegio de }
 Sr. Cortes. }

1808

Obervaci^on

Leyda el } De un Aneurisma en la
 7 de Febrero } arteria radial
 Dr. Rafael Cortes

Censurada

Leyda }
 el 11 de } Dr. Sebastian Roche
 Febrero. }

Nota del revisor. No contiene otra carpeta el papel de censura.

87-1-A-116

N. 564 -



808





En el día 14 de Agosto último fué consultado por Agustina de la Alave, de 20 años de edad, robusta, bien arreglada; el estado ventosa y viviente en casa de D. Ramon Asetget doctor de M. en la calle de S. Catalina la vieja sobre un tumorcillo con pulsación situado en la parte ~~interna~~ inferior e interna del antebrazo derecho, y a medio dedo del principio de la mano, al qual acompañaba un dolor obtuso de esta f. ve hacia agudo al emplearla con alguna actividad. El mal se habia aumentado con muchísima lentitud en tres años f. tenía el fecho que el tumorcillo era como un glúndante mediano, y los dolores de la mano no se oponían al trabajo ordinario absolutamente. Se hallaba el tumorcillo donde esta la arteria radial, la qual se tocaba inmediata a la cutis y algunas pulsaciones y desaparecía del todo comprimiendo mas arriba esta arteria y de manera f. para poca sangre por ella hacia la mano.

En vista de esto aqueje f. el tumorcillo era un aneurisma verdadero, y me persuadi a q. podría curarse disminuyendo el torrente de la sangre hacia él. ~~por algun tiempo~~ apliqué al efecto una bala de plomo de a onza vestida de lienzo, por una superficie plana f. forme quedándole una rebanada; sobre la arteria radial, tres dedos mas arriba del tumorcillo, y tres languetas, una de un dedo de grueso, una de dos dedos de largo entre la bala y el tumorcillo, otra desde donde terminaba la bala sucesivamente hacia el doblar del brazo de tres dedos de largo y segun

la dirección de la arteria radial como la primera, y la última el séis dedos de largo a la parte del antebrazo diametralmente opuesta a las otras dos; sujetándolo todo con una compresa circular y comprimiendo después por

Warga, ni los q. se medio de una venda circular de las q. tienen una cinta en la. dos costos q. se hize con equidad, para no comprimir circunferencia el antebrazo y limitar la compresion a la arteria

Habiéndome propuesto aumentar lentamente la compresion para evitar dolores, hinchazones, y gangrenas q. se opusieren a la continuacion de mi proyecto o a la muerte a su feliz ~~conclusion~~ conclusión apreté poco la venda en el primer dia, un poco mas a los dos siguientes, algo mas en los otros el quarto cruzando con alguna fuerza las dos cintas por encima de la bala; en el quinto afloxe la venda porque se habia hinchado la mano considerablemente y sobreviendo en ella dolores insoportables. En el septimo apreté algo mas la venda y seto el apósito, y habiendo graduado la compresion en el noveno, no descubí el antebrazo hasta el doce; en que tuve el gusto de ver q. no se formó el tumorcillo como habia sucedido en los dias anteriores al quitar el vendaje. En la sazón se presentaba menor dilatada la porcion de arteria q. mediaba entre el punto comprimido por la bala y la mano de lo q. la correspondia en el estado natural, y la cutis comprimida por la bala estaba gangrenada superficialmente.

Así desde luego q. llegaba el fin de curar este aneurisma sin cerrar la arteria no tanto por la circunstancia de no aparecer el tumorcillo cuando la arteria libre. De la compresion indicada quanto por la de q. siendo menor el torrente de la sangre, por la parte afectada apenas q. esta podia resistirle oponiendose en lo sucesivo a la detencion de aquella: sin embargo contemplando q. era poco

to algo entumada en el decimo

el tiempo q. habia decaido la arteria para repararse
se le su debilidad, y apegarse una reaccion constante-
mente enérgica, y temiéndose q. si se restablecia pronto como
era regular la antigua y natural corriente quedada la con-
presión se reproduciría el aneurisma recidivo continuax
la compresion aumentandola hasta q. se hiciere una esta-
ra gruesa para que cesandole la ulcera por una cicatriz
profunda y fuerte tuviere la arteria una compresion per-
manente que supliría por la bala q. quedaba por algun
tiempo sino para siempre al transito de tanta cantidad
de sangre como corría antes de practicar las referi-
das diligencias.

En consecuencia seguí apretando con la sucesion
ininterrumpida aflojando algunas veces por los motivos cita-
dos por espacio de un mes mas; contentandome parado
este tiempo con la aplicacion de dos linguetas una por
encima de la arteria radial en lugar de las dos y de la
bala, y otra en la parte opuesta, la compresa y la ven-
da moderadissimamente apretada, ya porque no pare-
cia necesario el primer vendaje, ya también porque
de otra manera se habria profundado la ulcera hasta
interesarse la arteria. A las tres semanas quedo forma-
da una buena cicatriz sin mas auxilio q. la manteca
de puerco sin sal; y quité el vendaje encargando á
esta joven q. por algun tiempo exercitase poco la ma-
no derecha y q. pasando unos dos meses la ocupase en
las cosas precisas de su oficio por grados estimando con-
teniendole de hacer esfuerzos grandes con ella.

Actualmente quita, bane, lava, fríega sin inco-
modidad, y no tiene ni como el aneurisma no obstan-
te q. la arteria radial pulsa sobre para diferencia como an-
tes.

Reflexiones

Esta observacion manifiesta q. pueden curarse aneuris-
mas sin cerrar las arterias mediante la compresion hecha
con prudencia, y solamente comprehensiva de la arteria
y parte diametralmente opuesta como lo conseguimos por
la aplicacion de las lonquetas quexas.

2.^o q. se podria esperar este feliz resultado
quando depararemos el tumor aneurismatico al divi-
narse el torrente de la sangre por medio de una compre-
sion bastante graduada y a alguna distancia del tumor
en la arteria q. abraze hacia el.

En arterias de mayor calibre tal vez no
se curarian de esta manera los aneurismas, pero nada
se perderia en probarlo puesto q. es un pais preciso q.
la curacion fundada en cerrar la arteria comprimida;
como haya oportunidad q. comprimir cerca del tumor
aneurismatico. Digo cerca. El tumor aneurismatico
porque si la compresion se hiciere a alguna mayor
distancia y dependo en comunicacion con el sitio aneu-
rismatico algunos vasos colaterales nos expoririamos

* No se ha-
blado el moti-
vo del mal que
no se sabe
q. haya resul-
tado: ni ya se
a q. aneurisma
vino a algun
movimiento
violento.

a nada en vano.
La cicatriz q. procure pudo contribuir a la
curacion radical por la razon indicada anteriormente,
y la recomiendo baxo el mismo respeto.*

No me extendo mas para no molestar a la Junta.
Madrid A 12 de Febrero de 1806.

Rafael Corta
de Quintana



