HSS1314

Dissertatio de Simplici in communi

Introductio

Cum studium pharmaciæ ita extensum vastissimum que inveniatur ut minimum ejus capitulum ab homine cuncta vis longevo neguaquam posit perfecte comprendi, nil hominis cum numerosis orbis centibus repletus sit tum integris, tum dimidiatis et ab illis procedentibus, quæ certa spes nunquam illa dilucide distinguere potuerit si hujus scientiæ studium exactas super illa noticias nobis suministraret ut illis uteremur tanquam medicamentis in hoc pulquerrimo speculo pharmaceutico ad humanitatis salutem: cunque mihi de Simplici dissertatio obtigerit ad quam exponendam eloquentia ad illam dilucide enodandam cauo (ingenue fateor) dicam tamen de illis pauca ut obligationem meam impleam et vobis innotescam progressus Studii mei conatusque solliciti Sapientissimorum Magistrorum meorum. Loquar primum de illis in communi deinde exigua exhibendo de conservatore minimum locans postea que ejus preparationem et conservationem in nostris officinis, humilime vobis deprecans ut errores meos non moleste ferant neque tanquam unum ex humilimis sectisque discipulis habeant.

arcubos: Divecata fulvescentes p.
ce et habemus Cacaum fourn fica

In comercio duos cuntur Ca
Sacai especies, fertiatum, album, c
fulvescum; hic ultimum primo e
fertiatum tantummodo uti debet in
necessitatibus.

Caracteres generales tum fi
tum chimici Cacai sunt sequentes:
Sapor dulcis, solubilis in aqua, cum
est fortum concentrata aeris esposita fer
mentatur. Sed hic cum non ex fortum, al
col illud dissolvit et melius gero est de
bilius; igne inflatur et carbo
natum gratum odorem olendo, acidum
sulfurieum illud carbonizat et formam
do aguam cum quadam portione ejus

Sirupi in Communi

hoc aspectu nulla incombenentia habet parti-
cipans corpus conservatum ejus proprietatum
medicarum.

De hoc Corpore agitur in tercia Seccione
Farmacofitologiae procedit a Sacaro oficinali
de Lineo Clave Tetandria ordine Triginia, fa-
milia graminearum de Jusu, in regno Vegetili
plurimum abundat in animali autem rarisime,
invenitur in radicibus fructis aliisque plan-
tarum partibus et enanguan sacari minime
bidentur in aspectu habent tamen Caracterem
fermentationis alcolice. Quo magis utimur in
Farmacia est Sacarum oficinale quod abun-
de cultibatur in insula Santi Dominici
in insulis Canariis et in regno granatensi.

Sub nomine Sacari inteligimus sus-
tantiam qualibet que cum fermenti contacto
producere queat alcol: intendendo a voce sa-
carorum caracteren exentialem escipere debe
mus abhatsectione portionem unam pro-

facultatem de Neapoli ei generose justa pos
positum meum tractaberum.

(Vixit)

Humillimus Vester Discip.

Antonius Pluviel

tales et foliis, arundinesque in moletrina
fomuntur ut minutissime fiatur et
deinceps tollatur succus qui ex ponto que
dam lacus existat labilis et alia inexi-
ta labilia materiam minimum fecun-
ta dabit vegetalis Testugine ofiden
vegetalis in suco plante interpositus
continebque absorbet alia que corpora
inventus etiam fermentum materie-
que salsine quantitate excedens fermen-
ti umiditatisque cuem continet facit
ut fermentetur, cui proter liquidum
cito fex bene debet. ad abstandam fermen-
tationem ad huc obscuntur in lebe-
tibus magnis ponitur calis abundan
portis siqueque fexbetur, huc itaque fac
to desinitur ut digeratur et liqui-

Definibi ysem simpob es legnido que-
dam abcentia in dolutione partes do-
lubileo corporum comdenbatorum per
sacanum, qua prater farmacopeo nob
subet exibere (exper) media propor-
tionata nature corporis cuyus pri-
cipia extraeret delamudo imo et to-
summet materiam omnium principiorum.
Sic itagne abicuando ultimum infusio-
ne abnatib deccoone intendum dilu-
latione & pro ut principia que de-
parare volumus (in necnec balde
aw matica textura g. fortis aut non
velimus extraeret (~~illi~~ nili partes do
lubileo eoden modo cum sacarum inter-
fombus attendeet debemus abicuan-
do temperaturam admos fenream inten-
dum debationen juxta principia com-

albumina dissoluta maneat in liquo
ponitur sorbio sacco necessaria in
ponitur aqua albuminosa et cum
illam misceatur qua exacte peracta ad
probe liquandum servitium ad sinu pa
randum agitatur colocaturque ca
super igne vene ocensum curando u
cum primum ebolbatur cum liqui
jam jam est ebulturus sustatur al
mina in liquido dissoluta in superfi
coagulari sinum ferendo portionem corpo
sum ostensorum quest sacarum abet pelu
quam albumina efformet impedi enitum
vaporum quo adusque sui vim habent
ad se expelendum hoc quo casu aditum
portiuncula aque fugide coaturque se
set ebolutio, tunque separatur albu
nan coagulatum. ~~Et~~ Item etiam
simpsi puntum determinatum densita
tis, que conoscetur per accumetum

ojigeni et dwojeni discipeatub ze-
manet carbonub, pitrieub combentitur
in acidum ojalicum, cun potava, fadiu-
soda, et cale videtur eformare con-
formationem cun illo, adendo cuiten acid.
aliquid huc opidio unitur, et zebiquid
Socaxum Cegxegatum.

Socaxum quo in Simpeb zih de-
bemub debet ese foefecte album et
ita solutum quadquan ~~de~~ prematur ne,
quaquan macam efieiat Sit que glo-
bulata, esue que globuli sint convexi,
partis que punta oposendedia ha-
beant gratiq. Sapoxib.

Socaxum adultexan Colet cale
et atxamento Sutoxio caltinato usque

ductorum immediate a vegetalibus qui ea
vi secretos materiis mandant habent an-
gium sed nobis minime un caracteren p
ponentem talis est materia secaque ydea
mana alieque plurima.

Planta que sacarum producunt diuersis
alijsque distancijs colocantur planciisque
bus tractactis in terre superficie aquem
alis arbustis comitate a gumbus sobrie
devent separari: colocantur in terra non
minimum calida et aliquatenus humida ut
quasi abscotia debet proxime exigerit:
anno transacto aperet planta oculum suum
secunditatem obstendendo et tum ejus annu-
dines secantur: obsecubatur ejus suum
propium abundantiam esse in par-
te inferiori quam in superiori: ut que
sectione fiunt separantur extremi-

Simpsi in Communi

Simpsi sunt liquida quidam venefitio
cum conservata qui ~~etiam~~ corum consistentia
quedam habentia in dissolutione partes solu
bles corporum venefici sacari conservatorum: a
xen qua poster sacarum medium est illa
conservans et conservator quidam recte quit
especia solubilia extractae intendere debemus,
medium conservatorem interponere ita ut pun
ctum mutatum alterentur.

In pluribus vacationibus medicina
pharmacia que professores ut egrotorum opi
nionibus consulant coguntur compositarum
medicamentorum modificare, ubi corporibus
ctiibet sacaro mele &, unde si in poterum
constitutis efecta est: insuper sacarum est
eodem corpus conservator, ut dictum, et subs

et est sacarum non crystalizatum remanendo in filtro crystalizatum, hoc sacarum est quod tertiatum Vulgo nuncupatum, qui bul illud album efficere alteri operatione subjicit in minori refinacione: efficitur accipiendo portionem quamdam istius sacari impuri tractatus sanguine cujuslibet animalis et clarificatus mellitus reducta itaque ad densitatem anteriori cyrcalem fit eadem operatio cum eo licet bentere ubi permanebit usque ad quadragintas gradus.
~~Ex~~ Eo casu crystalizanda reponitur in vasis conicis utique mansa remanserit liquidum erit permixtius et portiones conice sacari sole dicecantur purificantur que extatim terra alicua

huc aspectu nulla incomberentia habet partis
asperi corpus conservatum esse pro proprietatum
medicarum.

De huc corpore agitur in tertia Sectione
Pharmacologiae procedit a Sacaro officinali
de Lineo Clave Pentandria ordine Digynia, fa-
milia examinearum de quo, in regno vegetili
plurimum abundat in animali autem rarissime
inventum in radicibus fructu aliisque plan-
tarum partibus et arangnan Sacari minime
videntur in aspectu habent tamen Caracterem
fermentationis alcolica. Quo magis ultimum in
Pharmacia est Sacarum officinale quod abun-
de cultibatur in insula Sancti Dominici
in insulis Canariis et in regno Granatensi.
Sub nomine Sacari intelligimus sub-
stantiam qualibet que cum fermento contacto
producere queat alcol: intendo autem sa-
carorum Caracterem essentialem esse debe
mus abhatsectione portionem unam pro-

ad Siccitatem cognoscendum si saccum
abeat cal illud dissolvendo in aqua
et con certa portione azidi oxalici an
sulfurici nobis prebebit residuum albu
dam; Sic constituto atramento Sutorio
perferrumcianatum potabo, si vero ex
ex amibo percognoscemus illud pertur-
turum quod presentabit cum nobis tu
Colorem cerulleum pulcherrimum.

Hujus corpora simul commixta
sunt tum in farmacia tum in utu-
silis domesticis.

Cum dedecim ergo dean sacramen
cum his Sutentam hujus corpis conser
vandi ut initio promisi a perfectam
nunc preparationem et condensationem
simplicium in commun.

suspicetatibus medici fundata exactam non
est notitiam ex. Prima consideratio ad
preparationem simplicium est obtinuum ex
cum proportionare, communiter albo uten-
tur isto enim simpli non facile fermen-
tantur. Dividuntur etiam simpli in
liquidos aereos, spirituosos et acidos: in
aquosis comprendimus infusiones decocio.
nes et aquas destillatas succum plantarum
&. in acidis fermentationem acetosam &, et
in spirituosis ultimum liquidi alcolici
Clarificatione ultimum cum sacch.m
communem tractamus in holandica autem mi-
la ex necessitate si liquidis filtratis uten-
mur; in simplicibus autem post ebulitio-
nem effectus omnino necessaria est ad hoc
accipimus portionem quandam materie
plane aquosum ponuntur in vase capa-
cium sufficienten habeat superficiem, ad
cum particulae aquae agitatum quod ab
ipsis liquidum expumosum subtile et

binando et hoc modo diversimode sup-
pos preparamus: in aliquibus casibus
unter positis varia temperatura ordi-
nie regulamus in alib ebulitionem
ut simus ad actum debitum ubi re
ducendo ope utroque modo simpl
pre para mus. Simpl complicati in-
solubil ingredientium principia fixa
et volatilia regulantur temperatu
paxum elebate alioquib ubi debemus
temperatura paululum magis elebata
Simpl varib modis dividuntur in
simplices minimum et compositos, sim-
plicis illi sunt qui non admittunt
nisi principes solubilibus ex uni-
us solubi substantia hec duplicitet
dividuntur alia enim sunt simpli-
cia alterantia alia composita alte-
rantia Ad omnib dubiis in

do apponitur noba portio calis sanguinis bobis aut alterius animalis filtratur ter aut quater destillatur vehementer et per decantationem separatur fundum quod ebaporatur usque octuplum decem gradus, hec temperatura coquitur abundantula quod estuando et inter digitos apertos portio fulum faciat qui fractus inbolvatur, tunc ad ignem separatur postmodum in alembico vase ut frigescat usque ad quadraginta gradus: in hac temperatura fundum funditur in aliquibus basonicis inveneris et figulis hec in vase habent foramina coopeta, agitatur liquidum per vesp aut octo horas et in hoc casu cristalizatur quamquam imperfecte, discoperuntur foramina

Bunne seu tenus metuum aut per quas
bitatem especificam.

Alterantes simpli pustam naturam
fugudorum illos constituentes sicque
observatur alios magorum alicis ni
poten alteracionem pati.

Ylorum condebatio consistit in
iblorum optima preparatione ondi
nalia autem licet recte sint prepara
ti alteracionem tamen semper patun.
tur combenientib et paucam portio
nem preparare et illam asebare
in vasis bene coopertis et minime
corporum alexinorum odorumii
exponi.

Ypsorum usus in medicinis
sum magne considerationis ingre
diuntur multi in occasionibus ut
dubtificentur et gxationek sin pulve
ts infusionum. Videtur mihi quod su-