


BIBLIOTECA  
DE MEDICINA


EST. 36

TAB. 2

NÚM. 12

MADRID





Reverend

86

3

412

DEGRADIBVS MEDICINARVM



LAVRENTIVS MAIOLVS GENVENSIS IL-  
LVSTRISSIMO. ET EXCELLENTISSIMO DV-  
CIVDOVICO MARIAE SFORTIAE PERPE-  
TVAM FOELICITATEM.

Præter meam in te summam obseruantiam, præsertimque  
Hybleti Flisci patroni mei, dedititui tui integram fidem, nulla re  
gratiam tuam facilius me iniurum existimo, quàm munere littera-  
rio. quò & si minus præstare possum, ut te magnanimum prin-  
cipem (quem nullus satis potest) iure mihi promerear, tamè quia  
meritorum magnitudo potius uirtute animi pèstanda est, quàm ope-  
ris grauitate, non uereor quin hæc scripta nostra de artificiali  
graduum inuentione in medicinis, quæ excellentissimo no-  
mini tuo dicamus, & sub tuo auspicio publicamus, hilari abste-  
fronte suscipiantur. nam ego ista tibi tâto studio dedico, ut ma-  
iore non possim. tum quia nihil ex tota philosophia aut medi-  
cina grauius, aut humano ingenio desiderabilius occurrere pos-  
set, in quo maiores mihi laudes deberètur, si ea scriberem, quæ  
studio sis placerent, quàm sit hoc opus, quod suscepi. quod forte  
plurimi ea ratione prætermiserunt, quod priores, qui ante ausi fue-  
rant, aberrassent, & ipsi, si scriberent, implicare se erroribus ue-  
rerentur. Ego uero quanto me periculo exposuerim, non igno-  
ro. Quis enim tam uariis hominum iudiciis quibus me nunc  
ipse subiicio, satisfaciatur? Sed quia in magnis audere sat est, & ut  
ait Pindarus, μέγας δὲ κίνδυνος ἀναλκιν ἐφ' ᾧ τοὶ λαμβάνει,  
tantum me onus suscepisse, nunquam pigebit, cui si tui unius iudi-  
cio, non succubuero, summa mihi spes est, ut tuam mihi beni-  
uolentiam consequar, pro qua etiam deo optimo maximo agam  
semper immortales gratias, Vale.

Laurentii eiusdem prologus in totum opus continens necessitatem & utilitatem ipsius præsupposita auctoris intentioe.

Qui se se in scientiis præclarum aliquid posteritati linquere studet quanta ueneratioe philosophiâ Aristotelis p discetes admirantur, tanta debent imitatione modum eius scribendi dignum censere. Hoc enim ita ceterorū philosophantiū errores increpat in omniū fere suorū librorum principiis, sicut illa in ea proficiētibus admirabilem ueritatē perfectissima demonstratio ne concludit, quæ nec pura, sincera, nec facilis exprimi pōt, nisi undiq; ab erroribus calligatibus denudetur, & in se clara consistat. Mihi igitur nō nihil de medicinæ cōpositarū graduum in uentione cōmentaturo operæpretiū esse duxi opinionones non nullas priorū, qui super re hac philosophati sunt præmittere, earūq; radices breuiter attingere, ut suarū illorū non ignari recte dicta sectari cōprobare, & pro ipsis gratias agere possimus. Errata uero & insequamur, & refellamus, ne in id producāt bonarum litterarū studiosos, in quod fugiētes ipsi præter spem inciderūt, & sui erroris inscii apud posteros habituros se summā laudem & gloriam existimauerunt. Nec eos fallit eorum opinio, si æquus iudex pro studio cura & animo merita illis decernat, quāuis minus assecuti sint, quod pro posteritate elaborauerāt. Aliquā tamē nobis occasio ē præbuere q̄ huic rei operam posteri nauaremus, & id assecuti fuerimus, quod se nobis præstitisse crediderunt. forte enim si ipsi prætermisissent dicere, & nos opus illud minime aggressi essemus, multaq; nobis deessent uolentib⁹ recte philosophari, & medicinæ scientiā rationabiliter exercere. Quis enim tam ignarus medicus est, ut in proposito loquar, q̄ nesciat medicinarum cōpositarum sibi opus esse in ablatioe morborum & causarum & accidentium pro sola sanitatis adp̄tione: qui ue nesciat simplices ipsas medicinas per se nō sufficere: aut quod omnia necessaria pro morbis, pro causis morborum, pro causis & morbis, pro morbis & accidentibus, pro ac-

cidentibus tantum, pro complexione membrorum, pro loco  
pro colligantia, in eis singulariter acceptis non reperiuntur, aut  
quia plus, aut minus habent quam in cura conueniat, aut q̄ cū  
eo, quod expediens est contrariam possideant potestatem, &  
deniq; in se habeant, quæ ab artifice perito non cēsentur oppor  
tuna ueluti horribilitatem, uelocem nimium per corpus motū  
longam moram, transitum illac, qua nocumentum hūano cor  
pori inferant, & cætera, quæ quisq; medicus in medicorum li  
bris attritus per se partiri potest. Sed frustra quisq; his assentiat,  
& manum det nisi exacte cognouerit, quis ex cōmistis inter se  
simplicibus medicinis in composita gradus efficiatur? Nihil. n.  
iuuat in alicuius morborum cura tanti gradus medicinam com  
positam esse necessariam coniectari, si quæ sit talis nequeamus  
agnoscere, nec per nos ipsos possumus conficere. Quare cum  
hi qui ante nos fuerunt, quos uiderim, aut omnino in hoc ne  
gocio a uia ueritatis declinauerint, aut ueritatem, maxima diffi  
cultate implicitam ac etiam diminutam enunciarint, ut quod  
plane senserint, nō omnes ualeamus agnoscere. decreui ita bre  
ui priorum positionem eniti destruere, ut aliorum possim perse  
ctam & facilem sententiam explicare. Itaq; primū Iesu christo  
glorioso duce. & utrunq; nobis sua benignitate præstante pro  
positum sic aggrediar.

Traſtatus primus de inuentione graduu medicinarum.  
Caput primum de proportionē graduum ad inuicem ſecū  
dum Alchindum & Arnaldum.

Vm ſermo de inuentione graduum medicinarum  
compoſitarum nobis habēdus ſit, quid primo de  
c proportiōe graduū ſenſerint Alchindus & Arnal  
dus opus eſt referre, ut eo ordine progrediamur p  
tractantes quo exordientes promiſimus, Alchin  
dus igitur, & tpre antiquior, & fama celebrior, ueluti medietatē  
quandam temperamentum conſtituit, ſupra quā, graduū primū  
duplam proportionem habere argumentatus eſt, eandēq; pro  
portionem ſeruare gradum ſecundum ſupra primū & tertium,  
ſupra ſecundum & quartum, ſupra tertium ea ratione monſtra  
uit, q̄ inter propoſitiones muſicas, quæ quinq; numero ſunt, ſo  
la dupla dulciore ſeſe auribus ingerit, & quod dicitur decia no  
na problematum diapafon conſonatia cantatur ſola, & quod  
in ordine naturali ipſius numeri, primum augmentum p pro  
portionem duplam conficitur. Cui poſitioni conſentire uide  
tur Arnaldus in libro ſuo de gradibus medicinarum ratioēs af  
ferens per quas quod ipſe ſentit probabile fieri putat. Neceſſe  
enim inquit eſt q̄ itenſio omnis uel remiſſio ſupra uel infra tem  
peramentum ſecundū cōmunem aliquam rationem inuenia  
tur in omnibus gradibus. Talis autem ratio non poteſt de qua  
litate dici, quæ ſibi non magis unum gradum in ſubiecto ſecun  
dum ſe determinat quam alium, qualitas enim in eo q̄ qualitas  
non dicitur huius, uel illius gradus exiſtere quantitati, etiam eiꝯ  
extenſuæ minime intenſionis uel remiſſionis, ratio aſcribi po  
teſt propterea q̄ gradualis complexio uniformis eſt per totum  
ut ſupponitur in ſimplici medicina, & quantancūq; acceperis  
quantitatem eiꝯdem, quem totius gradum dixeris, & partis eē  
non negabis, quāuis non eadem uirtus omnino in toto & parte

uel in omnibus quibuscumque diuersis partibus existat. Communis ergo, & eadem ratio graduum est una & communis inter se proportio cumque hæc dupla sit primi gradus ad temperamentum, necessario conuincitur in eadem proportionem consequentes gradus inuicem se habere quod ex eo etiam uidetur admittendum quod gradus secundus tantum supra gradum primum operatur, quantum idem primus supra temperamentum, & consequentes gradus eodem modo inter se habent. Aequali igitur excessu & proportionem inter se naturali ordine distabunt. Obiecta etiam inquit Arnaldus aliorum sensuum si sensibiliter alterum ab altero operationem uariauerit duplam ad minus intra se proportionem habebunt. Et hoc iuncto fundamento optime compositarum medicinarum existimat uterque gradus inueniri posse, si cut inferius suo modo procedendo monstrabitur.

Caput secundum confutans prædictam positionem tanquam falso fundamento inixam.

Rædicta Alchindi positionem quam nonnulli rudiores propter rationes rhetoricas præductas, admirati sunt, ita confutamus ratione Auerrois quinto colligit, esset inquit Auerrois necesse remouere quartum gradum, tertius enim id ageret, quod quarto gradui tribuitur, nam ut inferius hoc capitulo declaratur absque dubio, gradus tertius interficeret, & non tantum manifeste læderet, rursus medicina, quæ est quarti gradus contineret sexdecim partes, partibus primi gradus æquales, nam proportionem sexdecuplam ad gradum primum quartus gradus haberet, quas partes corpus minime posset sustinere, sed gradu tertio periret, qui octuplam ad primum proportionem habet, quare inter tertium & quartum nulla distinctio assignari posset, quia in effectu conueniunt, distinctio autem in gradibus per effectus monstrari solet, Amplius nec gradus ipsi seruarent parem latitudinem, quauis natu

rali ordine collocentur. nam inter temperamentū, & gradum  
secū dum quatuor intercidunt unitates, inter uero gradū quar-  
tum & tertium octo, quare longe maior inter hos apparet excelsus.  
Nec ualet ad hanc dicere quemadmodum dicit conciliator  
differentia centesima trigesima nona, quod quartus gradus sex  
decim medietates, & non gradus continet, hoc enim falsum ē,  
quia gradus primus, & qui se habet in proportionē dupla ad il-  
lum duplam uirtutem eius continet, & est quasi ille geminatus  
& qui in quadrupla quadruplā uirtutem, & est ille quadrupla-  
tus, & sic deinceps, Aliter enim tantummodo esset excessus se-  
cundum denominationem maioris numeri, & non secundum  
uirtutem & ueritatem, quod non intendit Alchindus cum in  
re, talem constituat proportionem. Arnaldus uero ait quod im-  
pressio primi gradus est occulta alteratio in prima obuiatione  
corporis humani. Impressio uero secū di est alteratio manifesta  
i prima ē obuiatōe, tertii uero est occulta corruptō, q̄rti aut ma-  
nifesta. Ad dicit autem idem Arnaldus quod q̄ttuor operatiōes  
eandem quam gradus itra se proportionem habent. uidelicet  
duplam, quod tamen probatur esse falsum. Nam ut superius di-  
cebatur, tertius gradus faceret operationem quarti, & secundus  
tertii, & primus secundi, nam primus manifestam induceret al-  
terationem, secū dus occultam corruptionem, tertius uero ma-  
nifestam, huius ratio est, quia duarum uirtutum æqualiter sibi re-  
sistentium, si earum altera dupletur sensibilem manifestamq;  
in alteram alterationem inducet, quod signo monstratur mul-  
tiplici, & de duobus pugnantibus æqualium uirium ui tantum  
& nulla arte pugnantium de duobus etiam ponderibus æqua-  
libus altero deinde duplato nulla expuncto perpendiculi ad-  
ueniente uarietate, sed sola pō deris ratione. Ex feruētissima rur-  
sus & frigidissima aqua in proportionibus, & uirtutibus æquali-  
bus commixtis altera postmodum duplata, Semper enim qđ  
geminatum est sensibili alterum pro mutatione alterabit, Con-

futemus, & rursus aliter erroneam hanc positionem, & quam putaueram rationem, confringamus dicentes graduum distinctionem, quæ naturalis est non debere ex arithmetis, aut musicis suppositionibus assignari. Censentur profecto nonnunquam Pythagoras, & Plato reprehensionem non indigni quod naturalia per mathematica uoluerint demonstrare de genere in genus transcendentes cum scientia omnis ex propriis principiis sit, sed hoc sentiens Arnaldus excusare uoluit non ueluti propriam rationem Alchindum attulisse, quod ex arithmetica, aut musica ad propositum induxit affirmans, sed tanquam modum quandam quo inueniretur propositum astronomorum a more qui supposito planetarum motu per eccentricos fieri & epicyclos, quamuis hoc falsum a naturalibus existimetur, per ipsum tamen de multis, ut de eclipsibus aspectibus planetarum & de aliis certifiunt. Et me Herclen negari non potest ex falsis syllogisticis aliquid uere colligi. Factum tamen ab ipsis in proposito nondum comperi sed potius in errores esse delapsos ut in processu explicabimus. Neque præterea ex quocunque falso potest quodlibet uerum euidenter concludi ut patet in dialecticis exercitato, & nisi prius astronomis fauisset sensus antequam talem modum ex eccentricis & epicyclis adinuenirent, aut postquam tali modo ratiocinati sunt non dicerem ex falsis in uerum aliquod sua ratione perduxisse, ubi igitur deficit ratio & sensus iudicium non comprobatur ex falsis minime dicam uerum elici posse. Sæpius enim ex falso falsum, quam uerum sequitur, quod de proposita positione posterius monstrabitur. Non puto etiam alchindum aliquo pacto non uera se ratione argumentatum cognouisse quod illi ascribit Arnaldus, propterea quod pro uera ratione addit, quod in ordine naturali ipsius numeri primum augmentum est per duplum, gradus autem se habent secundum ordinem naturalem. Quod tamen non demonstrare credimus, sed potius hominem hunc falli dicimus, præcipue cum existimauerit tempe-

ramētum esse quasi medietatem primam uel potius unitatē.  
si enim sic esset proculdubio eius augmentum esset per duplū  
sicut augmentum primum supra unitatem tale existit, sed non  
sic res habet. est enim medietas extremorum nō simpliciter uni  
tas sicut inferius exactissime explicabitur, & est temperamētum  
ipsum numerus quidam supra quem sit augmētum per gradus.  
primum autem augmentum supra quemlibet numerum non  
est per duplum sed post primam unitatem semper in naturali  
ordine numerorum uariabis proportionem multiplicium su  
per particularium si augmentum primum addideris, & quod  
Arnaldus super induxit non est difficile soluere. Conceditur  
enim huic homini, quod una ratio communis omnibus est ea  
dem proportio non geometrica sicut uterque existimauit, sed  
arithmetica quod facillime constabit in his quæ per nos inferi  
us explicabuntur, Negatur etiam tanquam falsum & erroneum  
duplam proportionem requiri ad sensibilem uariationem. Ne  
gatur rursus quod per hanc uiam possimus certificari de quæsi  
to sicut infra deo concedente clarius luce monstrabimus, Con  
tra eādem hanc positionem arguit Consiliator prædicta diffe  
rentia mediis quibusdam, quæ quod friuola sunt prætermitto.

Refert etiam idem Consiliator positionem Constantini, quæ  
non multum est ad propositum, non enim distinguit gradus  
de quibus intendimus sed hos implicat cum gradibus latitu  
dinis naturalis, inquit enim æqualem complexionem antiqui  
intra duas extremitates dixerunt, primum uidelicet & quartum  
gradum latitudinis scilicet naturalis, in primo autem gradu ca  
lidum minus est calore naturali. In secundo autem quasi simile  
calidum autem in tertio est maius eo, & multo magis calidum  
in quarto, quare quoniam distantiam graduum, nec proportio  
nem assignat, sed tantum noticiam quandam confusam com  
parādo gradus latitudinis iusticialis ad calorem naturalem ideo  
tanquam inutilis positio hæc est prætermittenda, nihil enim no

stro proposito conducit, tu aduerte quod Conciliator eius positionem nō intellexit & falso eam increpat, tu iudica.

Caput tertium quod penes qualitatem habitualement medicinarum & non actualement differentia in gradibus est cōstituēda.

Edicina uel calida, uel frigida, uel alterius qualitatis dicitur, quæ primum a corpore permutata, dein  
m de corpus ipsum permutans ad hanc, uel illam permutabit qualitatem siue a calore nostro in minus  
mas secetur partes ut Galeno placuit siue ab eodem in calidiorem uel minus calidam conuertatur, quam corporis nostri calidum existat siue intrinsecus quidem sumpta fuerit siue extrinsecus appositā. Non quidem quod maiorem caliditatem, uel frigiditatem, uel quampiam aliam qualitatem calor noster præbeat quam ipse in se existat, sed quia medicina habitualiter talem qualitatem continet ultra eam, quam actualiter possidet ex elementorum mixture producta, quæ calore corporis excitata ad cōsimilem qualitatem ipsum perducat siue per ipsam habitualement qualitatem denominetur medicina temperata non inducens in humanum corpus alterationem, siue a caliditate uel alia quauis qualitate denominationem accipiat, uidemus enim plerumque tali qualitate habituali calida per suum contrarium in actum deduci sicut calx cui superinfunditur frigida quam primum calore reformatur intenso. Et transitu frigida super mineras calida & ebuliens aqua sentitur. Et marior soli expositum, & pannis inuolutum, suam sole excitat frigiditatem. Et flegma uitreum clisteri calido concitatum uehementius infrigidatur. At uero nisi huiusmodi habitualis qualitas ponatur, sed tantum passiuā potentia medicinae & eius qualitas actualis impossibile omnino est aliquam temperatam medicinam dicere nisi carnem humanam. Impossibile quoque

erit soluere quare uinum uetus calidius iudicatur, quam mustū  
& quare quædam uiuentia mortificant non in eo quod actu frī-  
gida quia uinū actu tale uiuificat. Calor uero naturalis dare non  
potest caliditatem ultra eam quam habet, nec frigiditatem mor-  
tiferam quam non habet. Rursus per diuisionem quam a calo-  
re naturali recipit cum assumpta fuerit fit actu talis si prius actu  
talis non fuerat sicut uidetur Auerrois Galeno ascribere, quam-  
uis mentem eius rationabilius extitisse hanc existimē, quod me-  
dicina cum ī paruas partes diuisa fuerit facilius per calorem na-  
turalem ab habitu ad actum perducitur, sicut Galenus testatur  
ex lignis siccis paruas in partes diuisis. Agit autem calor natura-  
lis non tātum in medicinam habitualiter frigidam, sed etiam in  
calidam, habet enim & ad hanc etiam contrarietatem. Eodem  
que modo dicatur de temperata, est enim illi contrarius cibus  
in sui principio, ut habetur secundo libro de anima, quanto ma-  
gis medicina quæ non nutrit etiam si fuerit temperata. Aduer-  
tendum etiam quod habitualis hæc qualitas de qua diximus nō  
omnibus inest æqualiter sed huic propinqua magis est actu idē  
ē de se habilis ut citius ac uelocius a nostro calore alteretur actue  
turque, illi uero tardius, quamuis eiusdem fuerint & qualitatē &  
gradus. Huiusmodi autem diuersitas a uariis potest causis eueni-  
re sicut a uarietate substantiæ & ab aliis, quæ patent exercitato  
in libris medicorum, posita itaq; qualitate hac habituali multa-  
clara fiunt, quæ Auerroim perturbant.

Caput quartum quomodo prædicta qualitas habitualis gra-  
dibus distinguatur.

Vnc operæpretium est speculari, quonam pacto  
prædicta habitualis qualitas tam in cibus quā in me-  
dicinis reperta, licet æquiuoce temperata, nunc  
primi, nūc secundi gradus, & sic deinceps dicatur.  
& rursus scrutari quā proportionem inter gradus cōstituere de-

beamus. Et pro huius intellectu supponimus, quod quæadmo-  
dum in æquali, & pondus si daretur in natura omnes qualitates  
ad gradus medios suarum latitudinum naturalium refractæ eēnt,  
pari modo in æquali, & iusticiam existimamus qualitates oppo-  
sitas ad medium latitudinum suarum iusticialium esse remissas,  
& rationabiliter quidem sic contingit eo quod, & ipsa æqualis  
dicitur. Præmittimus etiam quod utraq; latitudo tam naturalis  
quam iusticialis secundum philosophantes usq; ad gradum, ut  
octo extendantur excessusq; proportionabiliter utriq; latitudi-  
ni respondeat, ita quod eo modo quo gradus primus distempe-  
rantia per calidum in eo, quod est ad pondus æquale est calidi-  
tas quinque graduum, quæ uno dūtaxat gradu ponderalem qua-  
litatem superat, sic quoq; in æquali ad iusticiam primus intem-  
perantia gradus per calidum dicitur quintus uno tantum iusti-  
ciale temperamentum excedens. Supponamus tertio loco ali-  
ud, quo utraque latitudo conueniat quod est tam in latitudine  
naturali, quam iusticiali. nō possunt qualitates contrariæ in pri-  
mis gradibus simpliciter suarum latitudinum commisceri, ut ex  
ipsis complexio cōficiatur æqualis. Dixi simpliciter quia in primis  
supra temperamentum, & in aliis commisceri possunt, & inui-  
cem refrangi ad æqualitatem. Nam cum primo gradu simplici-  
ter sunt gradus septem qualitates oppositæ, si igitur in primis gra-  
dibus simpliciter mixtio fiat ex qua sit temperamentum, hoc  
nō erit rōne primorū graduū absolute, sed ratione tertiorū gra-  
duum super tēperamentum. Absolute igitur primi gradus sim-  
pliciter latitudinis præcisi ab aliis gradibus non sunt, qui in mix-  
tione temperamentum efficiatur quamuis sint uirtute æquales.  
Aliter rursus æquale non esset eiusdem ratiōis in omnibus, sed  
aliud quidem ex qualitatibus mediis suarum latitudinum con-  
starēt aliud simpliciter ex primis gradibus, earundem aliud ex  
secundis, & sic deinceps quod apud naturales monstratur ipso-  
sibile non tantum ad æqualitatem constituendam quantū etiam

ad quamuis distemperatarum complexionem. Nam denominatio semper fit, uel ab æquali, uel ab eo, quod temperamentum excedit, nunquam autem ab eo, quod infra subsistit. Idem suo modo sentio in latitudine iustitiali esse dicendum, quare colligitur ex prædictis medicinam primi gradus temperamētū uno gradu superantem in latitudine iustitiali non agere per unum gradum solum, sed per gradus quique, quia si (q̄ impossibile) remouerentur ab ea gradus quatuor & reliqueretur gradus unus, ipsa non ageret in corpus temperatum, quæ cum aliis gradib⁹ quatuor in illud agere potest. Includit igitur primus gradus primos quatuor quibus temperamentum cōsistit. Et propter hoc medicina calida in primo ad idem temperamentum proportionem habet sexquiquartam, calidæ uero in secundo ad calidam in primo proportio est sexquiquinta, & tertii ad secundum sexquisepta, & quarti & tertium sexquiseptima. Ita quod temperamentum partes quatuor continet qualitatis, quam gradus primus supra temperamentum continet, qui gradus primus est quintus in respectu ad totā latitudinem, cuius temperamētum habere dicitur partes quatuor. Secundi uero gradus intemperamenti respectu proportio est sexquialtera, & temperamentū quatuor sextas partes illius obtinet. Eo quod ille gradus secundus dicatur sextus, sicut temperamentum quartus habito respectu ad totam latitudinem qualitatis. Tertii autem ad idem temperamentum proportio est supra tripartiens, propterea quod habet temperamētum quatuor septimas partes de partibus qualitatis gradus tertii. Proportio uero quarti ad idem temperamentum dupla est eo, quod ille totius latitudinis gradus octo habeat, istud uero quatuor tantum, inter quos dupla mediat proportio, & habet temperamentum octauas quatuor de partibus octo qualitatis gradus quarti. Primus autem gradus respectu secundi quinque sextas habet de sex partibus qualitatis eiusdem gradus, habet etiā idem gradus primus tot septimas gradus tertii, totidem uero octauas gradus quarti. Et proportio secundi

ad ipsum ut dictum est proportio est sexquiquinta, tertii uero ad eundem est superbipartiens, quarti autem supertripartiens. Et habet gradus secundus septimas sex de septem partibus gradus tertii, totidem at octauas gradus quarti. Et proportio tertii ad secundum est sexquisepta, & quarti ad eundem sexquitercia. Proportio autem quarti ad tertium est, quæ dicta est sexquiseptima, & habet tertius gradus octauas septē de octo partibus qualitatis gradus quarti. Et ut omnia perfecte intelligantur, disponatur primum figura proportionis gradus superioris ad eum tantum, qui immediate antecedit, postmodum autem per deductas lineas à singulis gradibus ad temperamentum, & gradibus ipsis inter se omnis, quæ dicta est proportio, demonstrabitur. Itaque talē subiiciamus figuram.



Caput sextum demonstrans gradus, qui naturali ordine cōstituiuntur adinuicem nō habere geometricam eādem proportionem, sed tantum arithmeticam.

Ides quod à quaternario numero naturali ordine in octonariū procedētes nō pōt inter numeros minor ulla uel maior constitui quam ea, quæ ex superiori formula est digesta proportio. Et inter constitutos terminos semper unius ad proximum est æqualis distantia in omnibus, cum unus à proximo tantum sit unitate distans. hac enim gradus primus temperamentum, secundus primum, tertius secundum, & quartus tertium superat, & eadem se unitate proportionem inter dictos gradus posita superexcedūt. Etiā si quæ ordinatorum naturaliter graduum sunt ad unum aliquid referantur, & non solum si proxime tantum intra se comparentur. Relata enim sexquiquarta proportio, quæ inter gradum primum & temperamentum existit ad proportionem sexquialteram, quæ gradus secundi est ad idem ipsum temperamentum tantum, per unitatem distabit. per quartum gradus secundus gradum primum excedit. Eodēque modo est in gradibus cæteris, si qui sunt in naturali ordine proximi conferantur. eodēq; modo proportionem proximā inuicem comparentur. Itaque quanta naturali ordine, positorum graduum distantia fuerit, tanta est suarum proportionum, etiam si in aliquod tertium referantur, quamuis specificam proportio denominationem mutarit, modo tales gradus quorum proportio accipitur, cōsequētes sunt. Ex quo sequitur, quod in proportionibus nō semper quæ eiusdem generis sunt consequenter se habent ad aliquod unum, sicut in respectu temperamenti non omnes gradus proportionē habent de genere superparticularium aut superpartietium, sed ad idem temperamentum collati proportionem uariant, quas tamē ita immediatas dicere oportet, sicut gradus immediati sūt, qui eas habent in respectu temperamenti. Tantūmodo autem

multiplicitatis genus suas species ordine naturali collocat respectu unitatis, ut duo duplum sint unius, tria triplum, & sic deinceps, super particularium uero genus, quod supra binarium constituitur, ad quem ternarius sexquialteram habet proportionem aquaternario qui immediate consequitur generi super particularium uariatur, est enim duplum ad binarium, ad quem nulla prater eam quae dicta est super particularium species reperitur & denique ad nullum numerum, sed ad solam unitatem omnes consequentes naturali ordine numeri eiusdem speciei habent proportionem, quamuis eiusdem generis nonnunquam contingat, habet enim gradus primus ad temperamentum proportionem sexquiquartam, Secundus uero sexquialteram quae species eiusdem generis sunt super particularium non autem eiusdem speciei nec semper ea quae eiusdem generis est ab omnibus seruabitur numeris qui consequentes sunt. Sed quia non sunt haec presentis negotii & ex scientia numerorum facillime potest quisque deprehendere ideo de his finem scribendi faciam, Vnum duntaxat repetam eas esse proportionem immediatas, quae sunt uerorum tantum unitate distantium ad unum aliquid comparatorum. Et ut summatim loquar in hoc differt arithmetica proportio & geometrica, eo quod haec terminos aequali tantum proportionem coniungit non aequali, & indiuisibili differentia, sicut eadem est proportio binarii ad unitatem, quae est quaternarii ad binarium, quamuis hic differentia sit, binarius illic uero tantum unitas. Saepem etiam contingit eandem esse differentiam, ubi geometrica uariabitur proportio, sicut octo ad quatuor, proportio dupla est, duodecim uero ad octo sexquialtera, Arithmetica uero proportio est, quae eadem habet differentiam, non eandem denominationem proportionis, sicut cuiuscunque numeri ad eum, qui naturali ordine, uel antecedit, uel sequitur, & haec est communis ratio omnium graduum, quam quarebat Arnaudus, non proportio geometrica, sic ipse & Alchindus existimauerunt, & conuenientius sic habere per sequens caput monstratur.

Caput sextum declarans quomodo conuenienter, & ratio  
nabiliter gradus ipsi arithmeticam, & non geometricam inter se  
proportionem habeant.

Aristoteles, & qui post eum philosophati sunt peri  
tiores rerum species numeris & figuris comparaue  
runt. in his enim qualibet unitate addita uel subtra  
cta, speciem uariari necesse est. Quod & in specie  
bus reꝝ necessario contingit. differentia enim uel  
addita uel subtrahita species uariatur. Et quẽadmodum non sũt  
species duæ numeroꝝ easdem præcise unitates habentes sic,  
nec duæ rerum species substantiales easdem prorsus perfectio  
nes habebũt. Et rursus sicut maior numerus minorem uirtuali  
ter continet eodem modo, & rerũ formæ habent. superior enĩ  
id potest, qđ inferior, & amplius. Quæ omnia in figuris licet cõ  
spicere, quibus etiam Aristoteles secundo de anima, & octauo  
metaphysices species comparauit, in quibus uerior similitudo  
est, ut alibi dicitur. In proposito igitur sic existimo in gradibus  
esse. Arbitror enim unam temperatam speciem i numero quo  
dam constare, hoc est in gradibus mediis iusticialium latitudi  
num omniũ oppositarum quatuor qualitatum, quarum latitu  
dinem superius a non gradu usq; ad octauum extendimus. In  
earum igitur gradu, quarto qui medius est in latitudine usq; ad  
octo extensa uniũtur, ut complexio proueniat temperata, quæ  
an habeat latitudinem prætermitto. Nihil enim ad id quod in  
tendimus. Imaginor rursus ad mentem medicorum, quod ta  
men non omnes assentiũt philosophi complexionones quatuor  
simplices calidam frigidam, humidam, siccam, quarum quali  
bet latitudinẽ habeat, & quatuor compositas, calidã humidã,  
calidã siccã, frigidam humidã, frigidã siccam, calidã at & frigida  
nec simul coherẽt, nec simul possunt cõsistere. Idẽq; dicatur de  
hũida & sicca. Cõplexio itaq; medicinaꝝ oĩum simpliciuũ, de  
his, nũc loqmur aliquã prædictarũ nouẽ cõplexionũ, necesse

est suscipiat denoiationē, aut temperata est, aut distemperata secundum aliquē modū, uel simpliciu uel cōposita distemperantia. Et forte complexio simplex distemperata, nō sicut uniuersaliter inuenitur in simplicibus medicinis, sicut in specie corporum. Sed quia nihil est hoc ad propositum, ne in pertinētia pertractemus, de eo dicere prætermittamus. Prædicta igitur octo distemperata cōplexionū numero quodam constituuntur. Et quoniā inter se accidentaliter ordinē habent, una aliā uirtualiter cōtinere non dicitur. Calidū, n. non in se habet frigidū, nec id potest quod frigidum, & illo amplius essentialiter calido, & frigido per se consideratis, neq; frigidum ecōtra potestātē & uirtutem habet calidi, eo dēq; modo de humido sentiendū, & de sicco. Idem quantū ad hoc existimādū in cōpositis unius ad alteram facta relatione, uel unaquaq; species cū non sit speciatissima species, sub se habet alias species, in quas subdiuiditur, & dipartitur, quæ certe sicut numeri habent. Pro cuius intellectu sciendū, quod naturalis latitudo singularū qualitatum alio modo extrema habet, quā latitudo iusticialis, quæ respectu corporis humani temperati accipitur. In latitudine enim naturali, quæ est summū, nō habet oppositum, & cōstituitur in specie per ippositum nūmex denominantē ipsum summū. Sicut caliditas ut octo, quæ est extremus caliditatis gradus per gradū octauum quem hēt in specie reponitur, quæ dicitur species caliditatis, ut octo quæ nihil frigiditatis secū habet admixtū, & unaquaq; caliditas citra hāc, & ultra mediam propositæ latitudinis speciem capit, uel a caliditate, ut septē, uel ut sex, uel ut quinq; species aut dico accidentaliter propterea, quod est penes id, quod qualitati accidit, quatenus in subiecto ē. Intensio uidelicet & remissio qualitatis fit secundū maiorem uel minorem uel participationē subiecti, ut doctoribus placet, quæ qualitas ipsa in se considerata species habeat secundū quā nullam recipit uariationem, sed in indiuisibili essentia consistit, nec magis suscipiens, aut minus. Sunt igitur qualitatis species accidentales prædicto modo, & quot gra

duſ habuerit ſupra temperamentū, quatenus a ſubiecto parti-  
cipari contigerit, in tot ſpecies accidentales ſecari dicenda eſt.  
Quæ uero infra mediū latitudinis ſubſtiterit ſecundum ponentes  
contraria in aliquibus gradibus ſimul exiſtere poſſe, ſicut mihi  
ſæpe uisum eſt, probabilius proculdubio qualitas illa non de-  
nominat ſubiectum, in quo eſt, ſed eius cōtraria, cuius in ſubie-  
cto is gradus exiſtit, qui medium latitudinis ſuperat. conſidera-  
ta, tamen remiſſa qualitas in ſe, & in aliqua ſpecie accidentalī eſt  
ſuæ qualitatis, & denominari habet a gradibus infra medium, qđ  
dicitur gradus quartus facta extenſione totius qualitatis, uſq; ad  
octo. Denominabitur igitur prædicta remiſſa, qualitas a gradu  
priori infra medium, uel a gradu ſecundo, uel tertio, uel ab ipſo  
medio, quod ſi ſupra ipſum eleuata fuerit, denominabitur, uel  
a primo ſupra medium, uel a ſecundo, uel a tertio, uel a quarto,  
ſed gradus ſupra medium ſecundum tenentes, quo quomodo  
contraria, eſſe ſimul absolute ſine aliqua addiſtione ſubiectum  
denominant, qui uero infra medium non, niſi facta determina-  
tione propterea quod a qualitate contraria facta eſt denomina-  
tio. Tenentes uero contraria nullo pacto ſimul poſſe coexiſte-  
re a quocunque gradu ſubiecti facient denominationem.

Prædicti aut gradus ſecundum quos accidentales ſpecies ca-  
piuntur ſeſe uirtualiter cōtinent, & ſola quæadmodū numeri tā-  
tum differunt unitate nunquā æquales, uel in denominatione,  
uel in uirtute exiſtentes, ſed & numero, & poteſtate ſuperantes  
hi, ſuperati illi. Quæ in latitudine naturali diximus a latitudine  
iuſticiali non putamus eſſe aliena, niſi quod eius extremū, & al-  
teriq; gradus nō æquali partitione reſpondēt extremo & gradi-  
bus latitudinis naturalis. Nam medicina quæ eſt calida, in quar-  
to, qui eſt ultimus gradus ſupra temperamentum, ſicut etiā gra-  
dus, ut octo eſt quartus ſupra quartū in quo medietas totius la-  
titudinis cōſtituitur, quæ a non gradu uſq; ad gradū octauū pro-  
ten ditur minime in naturali latitudine, ut octo calida diceretur  
nam ignis eēt, & non aliquod corpus ex cōpoſitis, uel ſimplex

elementū in summo retinēs qualitātē. Rursus qui est gradus primus supra mediū in latitudīe naturali, nō erit gradus primus supra mediū in latitudine iusticiali, eodēq; modo de ceteris dicatur gradib; & demū qđ alia, & alia ī utraq; latitudine ē facta priorio. In hoc igitur utraq; nō cōuenit latitudo, in ceteris uero quā optime, imō uerius in latitudine iusticiali quilibet gradus spēm cōstituit, & medicinā oēs calidā in gradu priō apud medicos dici possent eiusedē speciei, eodēq; modo in gradibus ceteris supra uel infra temperamentū, quāuis in naturis propriis maxime distarēt. Hoc autē ex eo cōstat, qđ talis gradus oēs cōsimiliter de nominatā simplices uel cōpositā medicinā suscipiēt definitionē. Omnis uero gradus, ut dictum iam est nūero quodā cōficitur, & ipsum etiā temperamentū nō quidē in medietate, ut uoluit Alchindus, quasi in unitate consistit, sed potius per gradum quartū iusticialē unius cuiusq; qualitatis in se perficitur primus uero gradus, & qui cōsequūtur reliqui per tot unitates temperamento sup additas specificātur per quot unusq; gradus ī numero noiatur. Tam sufficiens autē hāc graduū distinctio est, ut ipossibile sit quicquā reperire respectu corporis humani teporati, quod ad illud non se habeat, uel ut temperamētum, uel ut ab aliquo gradu alicuius qualitatis denominatum in ipsis, postremo gradibus sese, ut numeri habentibus, & uirtus unius in alio continebitur in quo etiā aliquid amplius reperitur.

Caput septimum in reprehensione positionis Alchindi, & Arnaldi per applicationē suppositorum ad illam.

**X** prādictis constat quam maxima sint reprehensione digni, qđ æqualitatē ueluti medietatem quandam constituerunt respectu gradus primi, & eodē modo consequentes gradus intra se habere. Nam æqualitas iusticialis non potest ex gradibus latitudinis naturalis infra mediū existentibus confici. Propterea quod

complexio temperata tam secundum medicosquam philosophos uel nō recedit ab æqualitate ponderali, uel sit supra ipsā p calidū, & hūidū in natura potissimū hūana, quæ illi propinquius accedit. Cum igitur qualitates post cōmisionem non sint magis intensæ, quam ante commissiōem, impossibile profecto ē quod infra gradum medium suarum latitudinum in misturam proueniant, uel quæ postmodum intendātur, ut illud excedāt, & consequenter æqualitas ipsa in unitate sit cōstituta nō in aliquo numero cuius oppositum iam mōstrauimus. Cum igitur sufficienter declaratum sit temperamentum nullo pacto posse in unitate consistere, sed necessario in gradu medio iusticialis latitudinis, nunc rursus monstrandum esse impossibile gradum primum ad illud duplam habere proportionē hoc pacto. Temperamentum iusticiale, est ultra gradū mediū latitudinis naturalis per calidum, & humidū, & gradus medius est, ut quatuor, ergo duplum ad ipsum erit, ut octo, & ei quod est ultra quatuor duplum erit ultra octo, ultra uero quatuor est temperamentū iusticiale, ergo ultra octo eius duplum erit, & demum per additionem gradus ad qualitatem intensiorem elementari qualitate prouenimus, & sic ad calidius igne, & humidius aere, quod est omnino absolum. Non igitur gradus primus temperamentū in dupla superat proportionē. Rursus eandē habet gradus primus in latitudine iusticiali proportionem ad temperamētum, quam in latitudine naturali habet ad æquale ad pondus, in hac autem gradus primus temperamentum superat per solam unitatis additionem, igitur & in illa. Ne tamen nos nonnulla Auerrois uerba perturbent, aduertendum quod omnis numeri species ab ultima sui unitate speciem sortitur, quare & temperamētum iusticiæ in numero quodam consistens ab unitate sui ultima, quæ media est latitudinis, ut octo speciem capit. Et eatenus gradus primus duplam habet proportionem ad temperamentum, quatenus ad eius ultimam unitatem confertur, & non ad inclusas reliquas. Et hoc modo a nobis intelligendus est, ut pt

to Auërois sic dicēs. Et erat ei sufficiēs dicere, quod secundus  
eēt duplus primi, & tertius triplus, & quartus quadruplus, & sic  
intellexerūt medici in ordine graduū ad hoc, ut essent æqua  
les. His uerbis apertissime constat inchoasse Auëroim latitudi  
nē distemperantiæ a gradu primo usq; ad quartum, quem qua  
druplum primi ponit & tertium triplum, & secundum duplū,  
quod minime contingit secū dum geometricā proportionem  
sed tantum modo secū dū arithmeticam. secū dum quam tan  
tum gradus primus distat a temperamento quantum secun  
dus distat a primo. accepto itaq; gradu ultimo, uel ultima unita  
te, qua temperamenti species fit ad illam, erit duplus gradus, pri  
mus, & demum is, qui est ordine prior ad proximum cōsequē  
tem habet unitatis ratiōem, proximus uero binarii ad eum, qui  
in mediate præ cedit. Quod si non tantum ultima cuiusuis gra  
dus unitas accipiat, sed hæ etiam quæ intra ipsam concludū  
tur, non dixerim gradum primum, ad temperamentum du  
plam habere proportionem. Quod enim superius aduersus  
Alchindum arguebatur, sequeretur medicinam in gradu pri  
mo, in corpus humanum manifestam alterationem inducere,  
quod omnes pariter medici non affirmāt. Neq; in proportiōe  
graduū dissentīunt Galenus & Auërois, ut dicas aliam medi  
ci aliam philosophi in re hac haberi sentiētiā, habent enim uer  
ba Galeni, quæ inducit Auërois hoc modo. Et dicendum est  
quod illud quod intellexit Galenus in primo gradu est quod  
habet excessum super temperamentum in una parte ultra ipsū  
et secundum hoc quando componetur compositio dupli in  
excessu graduū non erit necessarium quod medicina, quæ ē  
in quarto gradu sit dupla super medicā, quæ est temperata sex  
decim duplis uicibus. Nihil profecto ex his uerbis clarius con  
stat quam hoc q; proportio dupla si inter gradus collocari de  
beat prædicto quo diximus, modo est faciēda atq; etiam, ut gra  
dus primus una tantum parte temperamentū excedat, quæ  
omnia Auërois existimauit esse de mente Galeni, quædamo

dum sequentibus uerbis sic comprobatur. Ait enim & quod dictum Galeni significat quando dixit. & mea intentio est in primo gradu. illa res. quæ manifestatur sensui in principio permutationis corporis. quod si gradus primus duplam haberet proportionem ad temperamentum permutationis quæ manifestatur in corpore a medicina primi gradus. non esset solum permutationis principium. sed perfecta. & manifesta permutatio. quod ignorauit Arnaldus existimans Auerroem consensisse. & existimasse gradum primum ad temperamentum duplam geometricam proportionem habere. cum longe diuersum senserit Auerrois ut monstrabimus. Et admiror profecto hunc hominem. qui sibi rationem Auerrois de proportionem gradus primi ad temperamentum obiecerit. deinde uelut Alchindo Auerroem consensisse. quod primus gradus respectu temperamenti. duplam habeat proportionem modo ipsius Alchindi. Et falsum etiam est nullam esse opinionem. quæ respectu temperamenti gradum primum dicat non habere talem duplam proportionem. ut apertissime monstrauius de Auerrois. & Galeno.

Caput octauum ex prædictis distinctam. eliciens responsionem ad ea. quæ superius generaliter soluta sunt de positione. Arnaldi & Alchindi.

Ed posito fundamento opinionis. ueræ reputamus rursus. & distinctius declaremus nonnulla eorum quæ superius breuiter & indistincte attigimus confutantes prædictas positiones. & dicamus primum quod proportio in gradibus seruatur eadem. cum æqualis distantia intelligitur ab uno gradu ad alterum. & a primo ad temperamentum. Et talis proportio arithmetica dupla est respectu eius quod gradum specificat. a quo actio prouenit. & penes tale duplicationem duplicatur & actio. Sicut forte ad mentem Aristotelis aliquando monstrabitur. & ex hoc loco Auerrois præducto in

nifesta patet. nā si calidū aliquā producat actionē quā nō possit  
tēperatū producere, actio talis nō fit nisi rōne excessus supra tē  
peramentū, pro quod nulla proveniebat actio. Et propterea q̄  
supra excessum duplabitur in duplo fortiorē operationē pro/  
ducat. Talem uero excessum habet gradus secūdu ad gradum  
primū, & tertius ad secundū, & quartus ad tertiū. Quod in obie  
ctis aliorum sensuū etiā explicare possumus. Si enī ponatur ali  
quod uisibile in aliqua distantia, ita quod sit maximum, q̄ non  
possit uideri, dico, q̄ non necesse est quod dupletur ad hoc, ut  
sit primū uisibile, nā si addatur medietas talis maximi sola uide  
ri profecto poterit, quod probatur per diffinitionē maximi, qđ  
nō potest agere, & id maxime si maximum in eo quod est maxi  
mum habeat denominationē, exempli gratia si dixerō q̄ in a. di  
stātia. b. uisibile, quod est decē digitorum, est maximū uisibile,  
quod ab aliqua potētia urpote. c. non possit uideri. Dico quod  
uno superaddito digito uideri poterit, secus enim si digiti decē  
non fuissent maximū quod uideri non potest, unde aduerte, q̄  
cū dicimus minimū dari intelligimus secundū aliquam deno  
minationem certā. Et hoc modo cessant importunitates sophi  
starum contra uiam peripateticorū, nam si illis decē digitis adde  
retur granum milii, & etiā nō uiderētur, nō sequeretur qđ ipsi  
de se digiti nō essent maximū quod uideri nō posset. Et rursus  
in maximo qđ nō, & in minimo quod, sic semper accipi debet  
quantitas minima secundū impositionem sicut in ponderibus  
exempli gratia sumimus granū ordeī. Et i proposito accipimus  
medicinam tēperatam, & dicimus illam esse maximū, a quo cor  
pus humanum nō potest permutari ad aliquā qualitatem. Cūq;  
ipsa habeat gradus quatuor qualitatis iustitialis, si illi addatur gra  
dus primus qui est supra temperamentum, necessario incipiet in  
corpus humanū agere. Aliter enī gradus quatuor non fuissent  
maximū, quod in idē non potuisset agere, Medicina uero in eo  
q̄ agens, est per gradus denominatur, & sic quarta pars addita  
sufficit ad actionem & non requiritur, quod gradus quatuor tē

peramenti gementur. Non autem semper quarta pars super-  
adiecta maximo, quod nō potest agere requiritur cū illo ad agē-  
dum. Nam si digiti octo sint maximū q̄ non potest agere non  
necessario requiruntur duo digiti, ut possint, sed tantū unus suf-  
ficiens est, qui octaua pars illius existit. Si uero tria essent maxi-  
mum, quod nō posset agere quarta pars superadiūcta forte non  
sufficeret ad agendū, sed requireretur tertia, nam quarta pars tri-  
um nō haberet eandem cū tribus denominationē, & in summa  
generaliter loquēdo, ut quod nō potest maximū agere, possit,  
requiritur una pars ex his quibus ipsum maximum denomina-  
tur, ut si denominatur pro octo, octaua pars requiritur super de-  
cem decima, & sic deinceps. Eodēmq; modo si per tria tertia,  
& si per quatuor quarta ad hoc, ut sit primū, tale, quod agere pos-  
sit. Nec puto inconueniens esse, quod sit infra hoc posse agere  
ut si decē digitorū quātitas sit maximū uisibile, quod ab aliqua  
potētia, & in aliqua distantia uideri nō possit eadem quātitas su-  
peradiectis tribus unius digiti quartis forte uideri poterit. Sed  
hac nō erit primū uisibile a tali potentia denominabile per inte-  
gra digitorum, quod intēdebamus quārentes quot sint digiti q̄  
in hac distantia ab hac potētia sint primū uisibile. Sicut etiam in  
mensuris & pōderibus potest per se quisq; animaduerrere. Nū-  
quā enim in quantitate cōtinua dantur tales denominationes ma-  
ximū, quod nō potest agere, uel minimū quod potest, nisi secū-  
dum aliquam denominationem factam, secundum quantitatē  
discretam intelligatur. Propterea quod nō datur minimum in  
quantitate continua quemadmodum in discreta si cut patet itel-  
ligenti. In medicina uero considerantur gradus, quodāmodo  
secundum cōtinuam & secundum quantitatem uirtualem iquā-  
tum tamen denominabilis est per gradus secundum quantita-  
tem numerosam.

**T**ra<sup>ctatus</sup> secundus in quo certificamur de qua<sup>litate</sup> sito princi-  
pali suppositis principiis de quibus iam determinauimus.

**C**aput primum tra<sup>ctatus</sup> secundi declarans qua<sup>litate</sup> comple-  
xio ex temperatis medicinis ac distemperatis distincta qualita-  
tis in eodem gradu efficiatur.

**O**stquam uera<sup>litate</sup> opinionis fundamētum iecimus  
ne longius propositum differamus uidendū cō-  
sequenter est de gradu resultante in medicinis cō-  
positis, & ut nobis facilius additus sit a faciliorib<sup>us</sup>  
incohabimus dicentes primo generaliter, quod  
si misceatur medicina temperata cū temperatis, aut distempe-  
rata eiusdem qualitatis & gradus, siue in eadē dosi, siue in diuer-  
sa semper resultat medicina composita eiusdē qualitatis & gra-  
dus, cuius fuerat unaquaq<sup>ue</sup> de per se ante cōmitionem. & hoc  
quidem rationabiliter contingit, propterea quod una aliā non  
habet nel intēdere, uel remittere. Primū quidem quia ageret ul-  
tra gradum propriū, secundū uero quia una alteri cōtrariaretur  
quorū neutrum ue<sup>l</sup> est, uel necessariū. Haberet etiā talis cōposi-  
ta medicina eandem dosim quā unaquaq<sup>ue</sup> simplicium p se so-  
la si omnium cōmunis dosis fuerit quā i eodem gradu eiusdē  
qualitatis collocantur. Dico etiam eundem in composita esse  
gradum & qualitatem, ac etiam dosim ratione mitionis consi-  
derata. ex alijs enim forte oppositū posset contingere. De mul-  
tiplicata uero dosi talis medicina idem sentiendum, quod de  
multiplicata dosi singularium de per se, & hoc loquor in com-  
paratione ad corpus humanum, nam duplata quantitas respec-  
tu eius gradum multiplicat & hoc generaliter est uerum, siue  
loquamur de actione qualitatum primarum, siue secundarum,

uel etiam tertiarum, in quibus secundum Auerroim distinguuntur gradus eodemque modo in eisdem gradibus eiusdem qualitatis cognitis per diuersa genera saporum in quibus secundum eundem etiam uariantur gradus secundum quancunque speciem, esto etiam quod inter quinque species saporum caliditatem significantium una secundum se alia calidior sit. Quod quomodo contingat dicendum est, quod gradus quilibet latitudinem habet & eam operationem quam facit natura calidior in uno gradu uelociter eandem facit natura minus calida in eodem gradu, sed non æque uelociter. Non est enim necesse quod natura calidior plures quam quatuor gradus habeat supra temperamentum. Sed de hoc sufficientius alias & explicatius. Nunc autem satis sit rem subtilem & pulchrā breuiter attigisse.

Caput secundū explicans quod gradus ex medicinis oppositarum qualitatum, in eisdem tamen gradibus & in æqualibus dosibus efficiatur, & quid faciat quantitas aucta alterius.

Non existimo incongruum inordinatūque consequenter determinare quis nam gradus resultat ex medicinis oppositis in eisdem tamē gradibus quod oppositum est eius quod priori capite continebatur. Nam oppositorum altero cognito alterius non est difficile assequi cognitionem, & Auerrois quidem sententia, quæ uerissima est, distinguendum uidetur tales medicinæ eiusdem gradus oppositarum, tamen qualitatum, accipiantur in una dosi, aut in pluribus, aut æqualibus numero, aut in æqualibus, & siquidem in una singularum dosi accipiuntur apud omnes certum indubitatumque est temperatam confici complexionem, utpote si uncix duæ mellis cum duabus dragmis sandalorum misceantur complexio temperata cō-

furget merito commistionis in his primis dosibus, quamuis possit ex modo preparationis aliter contingere. Si uero mellis quantitas duplaretur una tantum permanente dosi sandalorum, quamuis nno explicet Auerrois distinte qualis ex his complexio fiat, esset tamen medicina calida in primo, & infra unum gradum caliditatis, quæ melli secundum se debetur & dos talis medicinæ non erit qualis est mellis per se accepti. Sed maior & tanta quanta debetur eibis medicinalibus i gradu primo calidis. Nam ex duplicatione alterius medicinæ supra alteram secundū Auerroim augetur, uirtus auctæ. Propterea q̄ si quis duas comedat doses mellis, tāta caliditate alterabitur, quanta si medicinam sumpsisset trium graduum i prima dosi. Ad eundē itaque gradum dragmæ duæ sandalorum deducēt doses duas mellis ad quem reducerent calidam in tertio ad gradum primū ut expresse infra monstrabimus, ad idē igitur & duæ mellis doses reducerentur a duabus dragmis sandalorum. Nec ualet quod obiicit Arnaldus in suo tractatu de gradibus quod sequeretur medicinam simplicem, uel compositam per distinctas sui quantitates reponi in distinctis gradibus quod est in cōueniens cum sit uniformis per totum, & sic gradus multiplicarentur per multiplicationem quantitatum aut dosiū, & medicina admista suo cōtrario in qualitate non minus esset talis, quam simplex, & in se sola, mō dosi fuerit multiplicata. Nam conceditur quod medicina per distinctas sui quantitates si in corpus humanum assumatur reponitur in distinctis gradibus, ubi enim medicina habet agere diuersa eius quantitas diuersos habet gradus. Ex quo enim gradus medicinæ per eius actiōem dignoscitur, si distinctas habeat actiōes secundū uariā & diuersam sui quantitātē, quæq; actiōes distinctis debeātur gradibus distinctos quoq; gradus hēbit i sui quantitāte diuersa. Sed aduertēdū qđ una medicina aliter hēt i altera agere, & alio mō i corpore humanū. Et iō oportet distinguere penes qđ passum hēat distinguī gradus i medicina, &

manifestum est quod primo in comparatiōe ad corpus huma-  
num temperatum. Concederet igitur Auerrois, quod cum du-  
plici dosi mellis posita una sandalorum si compositū ex ipsis  
corpori humano temperato daretur causaret in ipso calidita-  
tem eandem quam medicina gradus primi utriusque acceptis  
æqualibus partibus. Si uero cum tribus dosibus una dosis po-  
neretur applicareturque & daretur corpori humano temperato il-  
li esset ueluti medicina calida in secundo, & sicut illa dosanda.  
Et forte quia illa una dosis esset iam cōuersa a tribus dosibus, ut  
in cōsequētibus apparebit ideo sensibilibiter loquendo eūdem  
produceret effectum si eius tanta quantitas acciperetur quanta  
sunt tres doses solæ ipsius mellis & idem, quod illa efficeret, qd  
si tota medicina resultans ex talibus nō detur in una assumptio-  
ne corpori humano sed eius aliqua pars dico, quod non ageret  
in ipsum eo modo quo medicina tertii uel quarti gradus. Nam  
ex cōmistiōe mellis uel sandalorū nunquā potest confici me-  
dicina quam mel calidior uel frigidior, quam sandali per con-  
uersionem alterius ab altera. Nam a tribus dosibus mellis, una  
dosi sandalorum uel conuertitur, uel parum abest. Et non am-  
plius est mistio, si enī duæ doses addūt gradum unum calidita-  
tis forte tertia dosis unū gradum etiā superadiūget, & erunt gra-  
dus duo in quibus mellis complexio constat facto, itaque tempe-  
ramento ex medicinis oppositaꝝ qualitatum in eisdem gradi-  
bus per aliquam multiplicationem alterius altera tandem con-  
uertetur sicut distincte in sequētibus explicabimus, in propo-  
sito autem conceditur quod in respectu corporis humani multi-  
plicatō quantitatis multiplicat gradum, respectu uero formæ re-  
sultantis per totam medicinam mistam non sic. Quia cum per-  
uenerit ad gradum alterius componentium quod multiplica-  
tum fuerit, non amplius in gradibus augebitur. Et quum dicitur  
ab Arnaldo non minus esset medicina talis cum suo contrario  
addita dosi quam simplex, hoc conceditur tunc maxime quan-  
do plures doses unius unam dosim alterius in se conuerterint

Nam doses tres mellis cum una sandalorum si ex ipsis accipia-  
tur una dosi nō minus nisi forte insensibiliter corpus humanū  
alterabunt quam una dosi solum simplicis mellis, & hoc quā-  
tum est ex ratione qualitatis, & si nō est mistio multiplicata toti-  
ens dosi alterius nō erit dosiatio ibi assignanda tanquā i medici-  
na composita, sed solum tanquā in simplici, & propterea doses  
plures cū medicina cōtraria plus corpus humanū alterant, quā  
una sola dosi ipsius simplicis medicinæ. ubi tamē seruatur mi-  
stio, & fiat mistum quod non sit tanti gradus quanti est alterum  
componentium, proculdubio tenendum est quod medicina  
cōposita est dosianda secundum quantitatem gradus qui uario  
modo & diuersimode resultat ex mistura tali facta ex pluribus  
dosisbus alicuius ipsarum supra alteram. Si uero utriusque medi-  
cinæ simplicis accipiantur plures doses, & nō tātum unius plu-  
res & alterius una sola. Si quidem accepta fuerint in dosibus æq-  
libus idē penitus sentiendū est de misto resultante ex ipsis quod  
prius sentiebatur de misto resultante ex una dosi utriusq; ipsorū.  
Si uero plures unius doses quā alterius acceptæ fuerint, tunc ui-  
dendum & considerandū quo numero, uel unitate altera, alterā  
in dosi excedat, & secū dum numerum dosium utriusque addē-  
dus est gradus deinde aliqd remittendū est ex gradibus medici-  
næ habentis pauciores doses, & aliquid addendū medicinæ ha-  
bentis plures doses sicut exempli gratia si sumeretur doses quin-  
que mellis & tres sandalorū diceremus, quod medicina ex his  
composita esset calida in aliqua denominatione, propter duas  
doses in quibus medicina calida medicinam frigidam superat,  
& talis medicina composita in una sui dosi non tantum ad cali-  
ditatem humanum corpus alteraret quātum una dosi sola mel-  
lis. Quamuis aduertamus hoc loco proportionem etiam arith-  
meticam seruari, sicut enim tres doses mellis per binarium nu-  
merum uincunt dosim unam sandalorum, eodem modo, per  
eundem binarium quinque doses mellis uincunt tres doses san-  
dalorum, tamen quia non tantum est una dosi medicina tein-

perata producta ex tribus dosibus utriusque, sed plures, ut infra uidebitur, ideo quinque mellis cum tribus sandalorum non facerent medicinam compositam calidam in secundo, sed infra ipsum. Id quoque non est hoc loco praterendum quod cum dicimus medicinam ex pluribus dosibus plurium medicinarum compositam esse tanti gradus intelligimus in se tali medicina considerata, nam tantum posset dosis multiplicari, quod gradum intenderet, quare licet doses tres mellis & una sandalorum faciant medicinam calidam in secundo, sicut erat mel solus, non tamen talis medicina est solum dosis una, sed ad minus doses tres, nam sandali iam ponuntur esse conuersi, & quia fundamentum omnium praedictorum est, quod duplicata quantitas medicinae gradum superaddit, ideo ne uideatur, quae diximus omnia esse uana signum apponam quo ita esse euidentissime appareat, sumptum uero est ab Auerroio quinto colliget. Si enim acceperis medicinam, quae sit calida aut frigida in tertio gradu si duplicetur augebitur gradus qualitatis, & ipsa de necessitate interficiet sicut interficit uenenum. Medicina itaque eius censetur gradus, cuius effectum produxerit. Duplata igitur, quae est tertii gradus, ex quo interficit, iudicabitur quarti.

Caput tertium de gradu medicinae compositae ex simplicibus oppositarum qualitatuum in distinctis gradibus secundum Arnaldum, & de eius positionis confutatione.

Extractandum post praedicta de gradu medicinae compositae ex simplicibus oppositae qualitatuum in distinctis gradibus, per hoc enim poterimus facilius uenari gradum medicinarum compositarum ex simplicibus in distinctis gradibus eiusdem qualitatis, Sed quia alium nobis Arnaldus graduandi modum reliquit, quam approbemus, ideo in graduandis compositis medicinis primo modum eius reprobabimus, in quibus non satis sane dixerit, po

Itē nostra sententia qua breuius atque facilius poterit explicabitur. Sentit autem Arnaldus aphorismo trigesimo primo tractatus sui, quod medicinæ temperatæ si inuicem misceantur quantum ex ipsis est solum temperamentum producant, in quo satis nostræ sententiæ uidetur consentire. Aduertendum tamē est quod forte & medicinæ temperatæ & quæ eiusdem qualitatis & gradus sunt improprie misceri dicuntur, quamuis temperatæ & quæ eiusdem gradus sunt & qualitatis distinctarum specierum sint & naturarum, nam hic mixtio consideratur a nobis penes qualitatem illam uirtualem de qua superius habunde locuti sumus, quæ in temperatis & in his quæ eiusdem gradus & qualitatis sunt, nec agit, nec patitur, quauis forte naturæ talium per actuales qualitates inuicem, & agant & patiantur, & ut sic misceantur utpote distinctarum specierum existentes. Secus uero quatenus eiusdem qualitatis uirtualis existunt. Ponit etiam idem Arnaldus ut eius ordine progrediar in aphorismi trigesimi secundi expositione, quod si temperatum misceatur distemperato, quod distemperatum remittitur, quod licet uerum sit, non tamen propter rationem quam ipse existimauit. Supponit enim quod si medicina calida in primo misceatur cum temperata, quod partes calidæ inuicem aggregantur, & quia calidum in primo secundum ipsum habet caliditatis partes duas, propterea quod ponit temperamentum ueluti unitatem, & ad gradum primum subduplam habere proportionem, quibus duabus partibus si addita fuerit pars quæ in temperato est erunt caliditatis partes tres, si autem partes frigidæ quæ in calido in primo & in temperamento existunt simul copulentur erunt frigiditatis partes duæ nam calidum in primo qualitatem temperamenti continet & aliam superaddit quibus inuicem iunctis erit gradus primus secundum sui denominationem in proportione dupla ad temperamentum, quod partem unam tantum continet qualitatis primi gradus, habet autem & gradus primus partem unam frigiditatis sicut & temperamentum, nec in hoc, uel tempera-

mentum ipsum superat, uel ipse temperamentum, his suppositis arguitur ab ipso, licet per medicinā tēperatā additur una pars caliditatis duabus, quæ sunt & continentur in gradu primo caliditatis. Et per eandem medicinam tēperatam additur una pars frigiditatis alteri, quæ erat in eodē gradu priō. Ergo multo plus proportionabiliter additur uni parti frigiditatis alia parte frigiditatis supra iuncta, quia fit duplum eius quod prius erat quā addita una parte caliditatis super duabus. Nam ex tribus partibus caliditatis ad duas, quæ prius erant in calido in primo fit solū trium ad duo proportio sequialtera. Et propter hanc rationē inquit Arnaldus medicina temperata addita medicinæ calidæ in primo de illius caliditate remittit. Nam in calido gradus primi partes calidæ in duplo sunt ad partem frigidam, sunt enim illæ duæ hæc una. Et per cōmitionem temperatæ cum calida in priō fit proportio sexquialtera facta cōparatione partium calidæ ad partes frigidas, quæ sexquialtera proportio proculdubio minor est quā dupla. Hæc ē tota eius sentētia quā ut potui clarius enarraui. Sed huius fundamentū ex antedictis constat esse falsū. Nō enī gradus primus supra temperamentum duplā proportionē habet, sed solum ut diximus sexquartā sumpto tēperamēto in medio iusticialis latitudinis in gradu ut quatuor. uerum autē est qd frigiditas, quæ est ut quatuor in tēperamēto in proportionē maiori addit supra frigiditatē ut tria, quæ est in primo gradu caliditatis, quā addat caliditas, ut quatuor eiusdē tēperamēti ad caliditatē ut quinque, quæ ē in eodē gradu priō. Nā frigiditas tēperamēti ad frigiditatē primi gradus caliditatis proportionē habet sexquiterciā, caliditas uero eiusdē tēperamēti ad caliditatē gradus primi unā subsexquiquartā habet proportionē. Tātū enim gradus remittit de una qualitate tēperamēti quātum supra tēperamētum addit de opposita. Et hoc iprædictis cōparatōibus de facili intelligitur, qd si rursus uelimus accipere proportōem quā habēt ptes calidæ oēs ad ptes calidas primi gradus tātū & proportionē quā habēt frigidæ oēs ptes ad ptes frigidas primi gradus calidita-

tatis facta commistione ex medicina calida in primo & temperata. procul dubio inueniemus esse auctam proportionem partium frigidarum omnium ad partes frigidas calidæ in primo quā sit aucta proportio partium omnium calidarum ad partes calidas primi gradus. Ex temperamento enim sumuntur partes quatuor frigiditatis. ex gradu autē primo caliditatis tres. quæ additæ prædictis. quæ erāt quatuor septem conficiunt. quarum ad tres proportio est dupla sexquitercia. Si uero omnes capiantur calidæ & conferantur calidis primi gradus tantum. procul dubio minor quam ea. quæ dicta est erit proportio. Sunt calidæ partes primi gradus quinq; quatuor uero temperamēti. quæ simul posita nouē cōstituūt quarum proportio ad quinq; est super quadrupartiens. Constat autem quod in maiori proportionē frigiditas temperamenti addit ad frigiditatem primi gradus quam caliditas eiusdem temperamenti addat ad caliditatem eiusdem. Et ideo uerum est quod medicina temperata remittit medicinam calidam in primo. quantum autem remittat. posterius erit manifestum. Non enim puto aliquo prædictorum modorum distinctā posse à nobis cognitionem haberi quantū scilicet una medicina de altera deprimat in mistione illarum ad inuicem.

De medicinis uero oppositarum qualitatū in distinctis gradibus tenet Arnaldus quod semper gradus inferior superiorem deprimat plūsq̃ quam per unum gradum. quod sic conatur ostēdere. accipiat inquit medicīa frigida in primo. accipiat quoque medicina calida in secundo. & accipiantur partes utriusque qualitatis. quæ sunt in uno quoq; eorum & addantur calidæ calidis. & frigida frigidis & deinde proportio calidarum ad frigidas inspiciatur & conferatur etiam proportio quam habeāt partes calidæ ad partes frigidas in calido secūdi gradus ad proportionē quā uim hēnt partes oēs calidæ simul ad partes frigidas quæ sūt in medicina cōposita ex medicina calida in secundo. & frigida in primo. Et manifestum est secundum Arnaldū qd calidū in secundo hēt partes quatuor caliditatis & unam frigiditatis. frigidū

uero in primo frigiditatis habet ptes duas & unā caliditatis ma-  
 nifestū ēt est quod partibus uniformibus simul cōiunctis erūt  
 caliditatis partes quinque & partes frigiditatis tres, qđ si capiatur  
 proportio inter has partes manifestum est, quod nō resultat pro-  
 portio eadē quā in utrovis cōponentium per se conspiciēba-  
 tur. nā in calido gradus secundi partes calidæ maiore proportio-  
 nem habent ad partes frigidas quā in composita ex calido in se-  
 cūdo & in frigido in primo, propterea qđ ibi est proportio qua-  
 drupla hic autē supbi partiens. Rursus in medicina frigida in pri-  
 mo est caliditas secundum eum media pars frigiditatis. in medi-  
 cina uero composita est plus quam medietas caliditatis sicut  
 constat de tribus respectu quinque quare cum medicina cō-  
 posita non habeat unam qualitatem quā respectu alterius qua-  
 druplam habeat proportionem non poterit esse in gradu secū-  
 do quia talis gradus per quadruplam constituitur proportionē.  
 In gradu autē primo etiam esse non poterit propterea qđ una  
 qualitas plus est q̄ medietas respectu alterius. primus autē gradus  
 resultat p proportionem duplā unius qualitatis ad alterā & hoc  
 modo inquit Arnaldus patet quod frigidum in primo remittet  
 calidum in secundo infra finem primi & idem frigidum in pri-  
 mo deprimet calidum in tertium infra finem gradus secundi &  
 calidū in quarto itra finē gradus tertii. Et rō huius est secūdu Ar-  
 naldū quia qualitas, quā ē in gradu inferiori non inuenit qualitē  
 gradus superioris liberā sed ligatā cū aliqua portiōe qualitatis na-  
 turæ inferioris & ideo q̄litas inferioris gradus illi addita plus distare  
 facit a tēpamento quā ipsa p se sufficeret. Sed i his dictis iā appa-  
 ret falsitas. nā æq̄litas nō debet ueluti medietas primi grad⁹ sup-  
 poni nec pro q̄rta pte secūdi, uel pro octaua tertii uel pro sexta  
 decima quarti. nā (ut mōstrauimus) secūdos gradus caliditatis ex-  
 cederet extremum ipsius latitudinis propterea quod tempera-  
 mētū iustificiale excedit gradū mediū latitudinis naturalis, qui ē  
 gradus quartus respectu cuius gradus primus habens duplam  
 proportionē ēēt, ut octo. & secundus gradus esset ut sexdecī &

tertius, ut triginta duo & q̄rtus ut sexaginta quatuor quæ nihil ab  
furdus. Proposito etiã temperamēto tanquã unitate & gradu  
primo tanquã binario, & gradus secundo tanquã quaternario, &  
sic deinceps cōstituta semp proportionē duplā gradibus suo  
modo manifestissima incōueniētia & absurda sequentur, impos  
sibile enī est quod gradus inferior deprimat superiorem oppo  
sitā qualitatis aliquāto plus quā gradus ipse inferior distet a tem  
peramēto, ageret enim ut cōstat ultra gradum propriū. Nā si fri  
gidum in primo coniungatur calido in secundo, & plus deprimat  
de calido in secundo quā ipsum sit frigidum, supra tēperamē  
tum pono p̄ possibile illud, quod a frigido in primo debet de  
primi ex calido in secundo esse separatū ita qđ in aliquo sub  
iecto sit caliditas sola maior uno gradu supra tēperamentum, &  
tunc quero an medicina frigida tātum in uno gradu illā corrup  
peret, an nō, & manifestum quidē uidetur quod nō, quia a pro  
portionē minoris in æqualitatis proueniret actio, immo forti  
us corruptio quod est impossibile. Dicesse forte quod accepta pte  
illa, quæ ex calido in secundo diminueretur p̄ frigidum in prio  
posita in aliquo subiecto non esset ultra gradum primū calida.  
Propterea quod ratione tēperamenti in medicina calida in se  
cundo gradu dicebatur ultra unum gradum. In se uero cōsi  
derata sine tēperamēto nō dicebatur tātū gradus. Sed hoc nihil fa  
cit pr̄inductæ rationi, accipio enim partem hanc esse cum tē  
peramento sicut est quādo ponitur in calido gradus secundi,  
nam aliter, nunc diceretur diminui ultra gradum unum, ex quo  
gradus denominat semper cōposito sibi temperamēto, nam &  
frigidum in primo p̄ duas medietates dicitur secundum ipsum  
quarum alterā hēt ex tēperamento, alterā uero ex eo. qđ sup addit  
In proposito igitur si ponatur calidum ultra primū gradū, ma  
nifestum est qđ frigidum in gradu primo p̄cise nō reducet ad  
tēperamētum, quod tamē deberet secundum eius rationē, quia  
frigidum in prio ultra gradum unū pōt remittere de calido gra  
dus secundi. Rō quoq; Arnaldi mihi nō potest uideri nō erro

nea. Nā medietates duæ frigiditatis rei frigida in prio, nō āplius  
 uiriū accipiūt ab una medietate frigiditatis quæ ē cū calido ī se  
 cūdo ratioe tempamenti quā ptes q̄tuor caliditatis quæ sunt in  
 calido in secūdo accipiāt ab una medietate caliditatis quæ ē in  
 frigido in prio secundū suā positionē. Et probabile q̄dem est &  
 rationabile tātū ab una parte caliditatis frigidi in prio auxilii præ  
 stari in resistendo ne ipsū calidū in secūdo remittatur, quātū in  
 remittēdo pars frigiditatis rei calida in secūdo duabus frigidita  
 tis ptribus quæ in gradu prio frigiditatis sunt pōt adiūmēti affer  
 re. Eo maxie qđ frigiditas gradus secundi est quodāmodo sopi  
 ta magis & contracta per quatuor caliditatis partes quā caliditas  
 frigidi in gradu primo sit per duas partes frigiditatis. Quare ho  
 mo iste dato uno inconuenienti alia admittit quæ nec philoso  
 phia ferre nec medicina potest tolerare. Sequitur enim præter  
 prædicta ex hac positione quod medicina in ferioris gradus iū  
 cta sua posita in gradu superiori proportionabiliter plus depri  
 mat si supiori gradu iungatur quā si īferiori. exempli gratia si me  
 dicina frigida in primo cōiungatur medicinæ calida in quarto  
 plus proportionabiliter deprimet quā si eadem iūgatur calida  
 in tertio sicut ipse expresse cōcedit. ob id existimo quod medi  
 cina īferioris gradus plus proportionabiliter addit supra mino  
 rem qualitatem gradus oppositæ qualitatis cū qua in specie cō  
 uenit quā supra maiore, quod hoc modo mōstratur exemplo.  
 sumamus enim calidum in quarto, cuius partes caliditatis secun  
 dum ipsum sūt sexdecim, accipiat etiam frigidum in primo.  
 cuius partes frigida sūt duæ, & quia calidum in quarto habet fri  
 giditatis partem unam, qua addita prædictis duab⁹ erūt frigidi  
 tatis ptes tres & quæ frigidū in prio caliditatis habet partem unā  
 ea igitur iuncta prioribus erūt caliditatis ptes decē & septē. Cō  
 stat aut plus proportionabiliter additū partibus frigidis quam  
 partibus calidis. Et rursus proportio quæ est inter partes calidas  
 ad partes fridas est quincupla superbipartiens, quæ manife  
 ste est infra proportionem quarti gradus ad temperamentum.

& infra etiam proportionem tertii gradus ad idem secundum eius positionem. Sed quia maior est quam proportio gradus secundi ad temperamentum ideo complexio medicina ex prædictis composita erit supra gradum secundum, & infra finem tertii. Partes etiam caliditatis diminutæ necessario plures erunt quàm octo, ex quo gradus quartus sexdecim habet partes, & est medicina composita infra finem tertii gradus, cuius partes sunt octo, erit igitur medicina calida in quarto plusquàm octo partes de præfata. At uero si medicina eadem frigida in primo medicina calida in tertio fuisset adiuncta, ad summum partes quique remississet integras. nam si remississet partes sex, sequeretur quod medicina calida in tertio duobus fuisset gradibus diminuta ex quo tantum habet caliditatis partes octo, à quibus ablatis sex duæ remanent, quæ respectu temperamenti gradum primum constituunt. Eodemque modo minus remitterent de gradu secundo quàm de tertio, & de primo minus quam de secundo. pauciores enim partes inferiori gradu semper medicina remittit. hoc autem inconueniens est, quam maximum & irrationabilissimum, quod facillime potest ostendi supponētibus primū nobis partes in gradibus esse æquales, quod etiam prædictæ positioni necesse est dicere, ut iam cōuicimus, ex quo temperamentum pro una parte accipitur in gradibus singulis, supra quam singuli suam constituunt proportionem, sunt igitur omnium graduū partes æquales. Si enim in uno gradu maior pars esset, quam in alio. non esset unus gradus ad alium in dupla proportionem. Hoc supposito arguatur sic, ubi est idem agens æqualis appropinquatio, minor resistentia debet fortior actio produci, quam ubi est maior resistentia, in duplo. Sed sic est quod in frigido in primo coniuncto calido in tertio partes tres frigiditatis intelliguntur, nouem uero caliditatis. Remittuntur autem per missionem caliditatis partes quinque ad summum. ergo ubi frigidum in primo iungatur cum calido in quarto, cum quo inuenit maiorem resistentiam, debet pauciores quam quinque caliditatis partes au-

ferre. Sunt enim partes resistentes decem et septem. partes uero  
agentes solummodo tres. igitur non possunt partes octo deprime  
re. Agerent enim plusquam in duplo ultra gradum proprium. Rur  
sus esset necesse dicere secundum hanc uiam, quod medicina  
frigida in primo medicinam calidam in tertio ad temperamen  
tum deduceret, quod nullus sanæ mentis auderet dicere. Nam  
omne agens quod sui uirtute potest in aliquod passum aliquan  
tum resistens potest in aliud passum tantundem uel minus resistens.  
& secundum eandem quantitatem actionis. Sed pres tres frigiditatis pos  
sunt ex partibus sexdecim ad minus partes octo tollere. ergo tres  
eadem partes ex noue poterunt tantundem ad minus remittere, &  
sic remanebit pars una, in qua temperamentum subsistit. quare medi  
cina frigida in primo coniuncta medicinæ calidæ in tertio pote  
rit ipsa reducere ad temperamentum, quod solum medicina frigida in ter  
tio in dosi æquali potest. dico. n. in dosi æquali quia multiplicata do  
si non esset in conueniens, frigidam in primo id agere, quod frigida in tertio.  
Eadem ferme uia qua reprobatus est Arnaldus de gradu compositæ  
medicinæ ex gradibus inæqualibus oppositæ qualitatum re  
probari potest in assignanda quantitate determinata remissionis uni  
qualitatis ab altera. In quo quod ipse hanc generalē regulā suppo  
nit. quod acceptis partibus utriusque qualitatis excedētis & excessæ hoc  
est gradus superioris & gradus inferioris oppositæ qualitatum, cum ad  
uertere debemus quanta pars excedētis sint pres excessæ, & si fu  
erit medietas, erit primus gradus, si quarta pars secundus, si octaua ter  
cius, si sextadecima quartus. Si uero nulla hæc præcisa occurrat.  
necesse est dicere, quod medicina composita est in aliqua meta  
alicuius quatuor graduum eo, quod semper proportio partiū  
excedentium & excessæ ad inuicem erit inter duas proportio  
nes graduū sibi consequentium. Inspiciendum igitur est inter  
quos gradus proportio partiū resultat, & hoc quando non est pro  
portio alicuius integri gradus, & hoc modo sciatur quæ meta gra  
dus sit, in quā medicina inferioris gradus superiorem deducat.  
Quod ut clare intelligatur manifestemus exemplo. Compona

tur medicina tēperata cū medicina calida in primo & accipiā-  
tur partes calidæ quæ secundū eius doctrinā sunt tres, & partes  
frigidæ, quæ sunt duæ, inter calidas autē & frigidas partes non re-  
manet dupla proportio, ut possumus dicere medicinam hanc  
cōpositā esse primi gradus neq; eadē pōt esse tempata, cum una  
tertia caliditas superet frigiditatē. Meta itaq; aliqua, quæ sit citra  
finē primi gradus erit situs talis medicinæ cōposite, Meta uero  
ipsa hoc mō deprāhenditur p fundamentū qđ uigessimoquin-  
to apophorismo supponit, Cōstat. n. secundum intellectū ip si<sup>9</sup>  
qđ uirtus qualitatis depressæ in quolibet gradu tātū minuitur re-  
spectu sui in temperamēto quātum superatur a qualitate eleuata,  
& sic frigiditas primi gradus est i duplo minoris uirtutis quā frigi-  
ditas temperamenti, Quod si id in quo minus est frigiditas pri-  
mi gradus dematur a tota frigiditate cōposita scilicet ex frigi-  
ditate temperamēti & frigiditate primi gradus caliditatis rema-  
nebunt duæ tertiæ de qbus si auferatur medietas toti<sup>9</sup> integri re-  
manebit sexta totius integri, quæ ē tertia medietatis toti<sup>9</sup>. ista igitur  
portio frigiditatis, quæ est in temperamento respectu cuius fri-  
giditas primi gradus habet rationem tertiæ partis, aufert primo  
gradui caliditatis partem tertiam. Ita quod qualitas depressæ tā-  
tum aufert a qualitate eleuata quātum uirtus qualitatis depres-  
sæ cum gradu q̄litis eleuatæ minuitur a uirtute eiusdē q̄litis  
depressæ cū gradu qualitatis nō tātū eleuatæ. Hic modus sup-  
ponit radicem, quam superius reprobauimus de duplicatione  
graduum inter se, ulterius est diminutus non assignans rationē,  
quare accipi debeat differentia qualitatis remissæ in ipsis conpo-  
nētibus & hāc subtrahere a partibus eiusdem qualitatis remissæ  
resultantibus ex utroque cōponentiū, & tātundē deprimere de  
qualitate eleuata. Præterea etiam fundamentū est falsum, & suæ  
positioni repugnans, qđ scilicet tantum uirtus depressæ qualita-  
tis in quolibet gradu minuatur respectu sui in temperamento  
quantum qualitas depressa superatur ab eleuata. nā si sic quo-  
modo medicina qualitatis depressæ, & gradus inferioris plus pōt  
minuere de qualitate opposita eleuata i gradu superiori quam

de eleuata in gradu inferiori cum in gradu superiori habeat oppositum fortius & cōsimilis, qualitas debilior sit in uirtute. Debilior est enim frigiditatis pars, una in gradu quarto, quam eadē in gradu tertio, eo qđ in quarto plus superatur ab eleuata. Quomodo igitur eadem, utpote frigida in primo gradu plus diminet de caliditate quarti gradus quā tertii. Quare hęc tota imaginatio confusa est, nunc rationalis, & ad multos perducens errores. Verū tamen si nostro modo cōparatio fiat inter calidū, i primo & temperamētum, uerum erit quod frigiditas calidi, in primo arithmetica erit mioris uirtutis quam frigiditas temperati. Nam in calido, in primo sunt tres gradus frigiditatis i temperamento uero quatuor, & sic per gradum unum exceditur frigiditas primi gradus caliditatis a frigiditate téperamenti, & eodē modo temperamentum per tantūdem superatur in caliditate a primo gradu. Hoc autem Arnaldus nundum uiderat.

Caput quartum qua multiplicatione opus sit, ut medicina quę est opposita qualitatis conuertat alterā distincti gradus, uel in se uel ad temperamentum secundum Arnaldum, & confutatio positionis eius.

Estat uidere hoc loco qđ multiplicata quātitas alterius medicinae facere habeat i medicina cōposita. Et si quidem medicinae simplices in oppositis qualitibus fuerint distinctorū graduum, duplicata medicia superioris gradus (putat Arnaldus) eam acquirere medietatem eius quod perdiderat per medicinam inferioris gradus sibi adiunctam. Quod an omnino uerum sit. posterius erit a nobis discutiendum, quod autem putat terminum superioris medicinae facta multiplicatione ipsius in dosi esse gradum suum propriū recte dicit, & quod multiplicata dosi inferioris duplex potest terminus occurrere, & temperamentum & situs complexiōis propria. Sed admodum fallitur cum nume


rum multiplicationis requisitum in medicina inferiori, uult de  
terminare ad hoc, ut superiorem reducat ad temperamētum.  
Exempli gratia ad hoc, ut frigidum primi gradus, calidum quar  
ti contēperet, dat ipse talem regulam. Inter calidū in quarto, &  
frigidum in primo sumenda est differentia in partibus calidis  
ad partes frigidas, & manifestum est, quod secundum modum  
eius calidum in quarto, habet partes quindecim caliditatis plu  
res, quam habeat frigidum in primo, quod eo tantum plus hēt  
partem unam frigiditatis. Superatur igitur portio una frigidita  
tis a quindecim partibus caliditatis, in quindecupla proportōne.  
& toriens (iquit Arnaldus) multiplicari oportere dosim frigidi  
in primo, ut fiat temperamentum ex eo, & calido in quarto. Et  
per eandem rationē, si septupletur frigidum in primo, tempera  
bit calidum in tertio, & si tripletur reprimet calidum gradus se  
cundi ad æqualitatem. Per consimilē etiam rationē, si frigidum  
in secundo quinges accipiatur calidum in quarto, reducet ad  
temperamentum. tertium uero gradū ad idē reducet, si solū  
duplicetur & addatur tertia eius pars, hæc omnia secundū eius  
positiōem clare patent acceptis partibus uniuscuiusq; gradus  
qui simplicem medicinam denoiat facta comparatione inter  
partes oppositas, & secundum denominationē proportionis,  
sumendus erit numerus multiplicationis medicinæ inferioris eo  
modo, quo exemplo monstrauius, & semper ut fiat æquali  
tas inspiciendum est, ut æqualis sit numerus partium utriusque  
qualitatis, nam tunc habetur propositum. Sed huiusmodi po  
sitiō mea quidem sententia multipliciter sibi contradicit. supe  
rius enim posuit medicinā inferioris gradus plus proportiona  
biliter diminuere de medicina oppositæ qualitatis in gradu su  
periori, q̄ in gradu inferiori. Hoc autem loco uult in multo ma  
iori proportionē medicinam inferioris gradus superaddi debe  
re medicinæ superioris gradus, q̄ medicinæ gradus inferioris, ad  
hoc ut conuertat ad temperamentū, in maiori quā proportio  
ne, quā se hēant gradus superior, & gradus inferior, a quibus debet

fieri detractio seu remissio. exēpli gratia. si quinque doses medicinae frigidae in primo possunt medicinā calidā in tertio ad temperamentum reducere pauciores quā decem debent sufficere ad reducendum calidū in quarto ad idē temperamentū. ex quo una tantū dosis frigidi in primo scdm eum est sufficiens ad remittendū calidū in quarto infra finē tertii. accepta igitur hac medicina intra finē tertii. manifestum est. quod scdm positionem eius per frigidū in primo reducetur intra finē gradus secundi. Cui si itē addatur frigidum in prio. necessario reducet intra finē gradus primi. per tres itaq; doses tantū reducet calidum in quarto intra finē primi gradus. nec requiruntur doses duodecim. ut post modum. abhinc deducat ad temperamentū. ut summa sit quādecim dosium. Sed tantū præter prædictas tres doses. una dosis sufficiet. maxime cum in gradibus æqualibus opposita medicina se ad temperamentū refrangāt. frigidum at in prio opponitur calido in prio. quod factum est ex calido in quarto per tres doses frigidi in primo. Rursus hoc loco pugnātia ponit. Si enim duplicata quantitas restaurat medietatem eius. quod hēt simplex quantitas facta ab ea detractioe per medicinam oppositā qualitatis. quod ipse putat esse de consensu oīum medicorum quantum ad medicinā gradus superioris. Exēpli gratia si cōiungatur medicina calida in quarto cū medicina frigida in prio. dicamus gratia exempli. quod deprimitur gradus unus caliditatis. quāvis Arnaldus teneat quod depressio fiat ultra gradum. duplicata igitur quantitate medicinae calidae in quarto. acquiritur medietas gradus. & triplata reddit gradus quartus. qui fuerat denominās ante missionem. Accepta uero medicina gradus inferioris. utpote frigida in prio. Si dupletur quantitas eius. debet eodē modo proportioneabiliter augeri. Una at dosis eius ex calido in quarto remittit plus. quā per unū gradū. ergo duplicata dosis per unū gradum & dimidiū uel ultra. & triplicata per duos gradus. & ultra. & quācupla ta per tres. & septuplata per quatuor. ita ut semper per doses duas gradus unus remittatur. Et sic ad summū septē dosibus medici

nã frigidã in primo ad temperamentum, calidã in quarto me-  
 dicina deduceretur. Verum autem est qđ ipse dicit contra Al-  
 chindum, qui putauit multiplicationem fieri debere scđm do-  
 sim medicinã deprimendã, & non secundum dosim medici-  
 nã deprimentis, quãuis in numero dosim uterq; conueniat.  
 Nam ut dragma una piperis ad temperamentum per uiolas de-  
 ducatur, quã sunt frigidã in primo secundum Alchindũ suffi-  
 ciunt dragmã quindecim ipsarum. scđm uero Arnaldum req-  
 runtur dragmã qđragintaq; earundẽ cũ dosi eas sint drag-  
 mã tres. Expimento .n. cōstat (inqt Arnaldus) quod facta mistio  
 ne mō Alchindi quãtũ cunq; medicina fuerit fermẽtata, adhuc  
 est notabiliter acuti saporis. Nihil at tale est tẽperatum. Recte q  
 dem in hoc. sed nec ipse rectũ posuit numẽ cũ pauciores do-  
 ses uiolã sufficiãt. si. n. tot accipiãtur quot ipse dixit, accipien-  
 das nō tantũ tẽperata, sed etiam frigidã in prio' medicina confi-  
 citur, quare nec ipse oĩno potuit charybdi euitare, si cut accura-  
 tius mōstrabitur cũ nostrã hac re opinionẽ exposuerim. Vtri-  
 usq; igitur opinio ueluti nō naturalis, sed onerosa abiiciẽda est,  
 qã quẽadmodum (inqt Auerrois), nō pōt esse maior error arte  
 medicinã, quã ille quẽ posuit Alchindus, in cuius fundamento  
 ẽt cōcordat Arnaldus, qđ hĩs prãmissis positionibus, ut mōstra-  
 uimus irrōabilib⁹, & cōfufis procedẽdũ nobis est alia uia, & ubi  
 defecerit, gante nos fuerũt nostra opa cũ deĩ gratia suppleatur.

Caput quintum de gradu medicinã cōpositã ex simplici-  
 bus oppositã qualitatum indistinctis gradibus, & cōfutatiõ e-  
 rationum Arnaldi aduersus Auerroim.

Vo capita per nos iam posita sunt ante determina-  
 tionem positionis Arnaldi primum de dignoscẽ-  
 da medicina composita ex simplicibus eiusdẽ qua-  
 litatis & gradus secundum de cognoscenda medi-  
 cina composita ex simplicibus oppositarum qua-





eius ratio in hoc sustinetur, & fundatur, quia quantū una qualitas fortificatur supra temperamentum tantū potest reprimere contrariā, & quia frigidum in primo per unū gradum superat temperamentū, per tantundē remittet calidū, in quarto. Sed contra, quia secundū Auerroem, nō potest hoc dici p̄p̄ea quod nō eadem seruetur proportio in gradibus, nā proportio quæ ē gradus primi ad temperamentum, non est aliōq̄ graduum ad gradum primum. Hæc sunt quæ Auerroi obiicit Arnaldus, quæ non puto hēre uim maximā, si q̄s ea, quæ præmisimus oīa bene aduerterit. Dicamus igitur quod expientia, & rōne constat tantum medicinā superioris gradus deprimi ab opposita inferioris gradus quātum hæc distiterit a tēperamento, expientia inquam eo mō quo cōplexio medicinæ simplicium est repta ab effectu quē in corpus hūanum producūt. Rōne uero nō ea, quā ipse sup̄induxit, & ascrip̄sit Auerroi, qui nō sensit qd̄ ille existimauit de proportionē graduū ad tēperamentū, & qd̄ primus ad illud duplā hēat proportionē, sed eius rō est, quia quēadmodū additio in gradibus p̄ ordinē naturalē nūeri cōficitur, ut sup̄ior respectu inferioris addat gradū unū. Similiter subtractio seu diminutio & remissio debet fieri prædicto mō ordine retrogrado scđm naturalē nūeri cōstitutionē. Quia igitur medicina calida, ī quarto hēt latitudinis iusticialis gradū extremū includentē latitudinē totā caliditatis, quæ respectu nō gradus dicitur eē, ut octo respectu uero mediæ latitudinis in q̄ cōsistit æqualitas, ut q̄tuor. Si igitur accipiat gradus octo caliditatis ī una dosi alicuius simplicis medicinae calidæ, in quarto, & accipiat et̄ dosi una frigida, in primo gradu, quæ respectu totius latitudinis frigiditatis est ut qnq̄, respectu uero tēperamenti, ut unū, & duæ hæc medicinae inuicem misceatur calida, uidelicet in quarto, & frigida ī priō. manifestum ē qd̄ illa, q̄ est quarti gradus debiliore uincet, quæ est gradus primi, uirtus tamē fortioris debilitabitur, quātū uirtus inferioris superat tēperamentū. Et quia frigidū in priō per gradū unū tēperamentū excedit calidū, in q̄rto ad calidū, in tertio faciet declina

re. Simili quoq; rōne si eadē frigida medicina primi gradus addatur calidā tertiā ad gradū scdm̄ reducet. Ita ut generaliter loquēdo gradus inferior medicinae oppositae q̄litas hēre debet tanq̄ id qd̄ subtrahitur. gradus uero superioris medicinae ut id a quo fit subtractio. Et rōnabiliter quidē haec oīa ex eodē Auerrois sūda mento nascuntur. Si. n. frigidū, in q̄rto calidū in quarto in proportionatis quātitatibus reducitur ad temperamentum medicina igitur frigida in tertio admixta praedictae calidae in quarto in eadem proportionē arithmetica debet minus posse, in qua deficit medicina frigida in quarto, deficit autem ab ea per unum gradum. ergo in uno gradu minus debet medicina praedictam alterare posse. Illa autem, quae erat i gradu quarto, poterat ad aq̄litate usque remittere. ergo frigida tertiā debet uno gradu minus posse, quare ex ip̄s inuicem mistis resultabit medicina calida in primo. In eadem etiā proportionē debet minus frigida i scdo in respectu ad frigidā i tertio, & simili mō debet hēre frigida in primo ad frigidam, in secundo. Et sic fundamenta Auerrois non solum deseruiunt in graduum intensiōe, sed etiam in remissione eorundem quando fit medicinarum oppositarum qualitarum, & graduum compositio. Ratio autem, quae inducebatur ab Arnaldo in confutatione positionis Auerrois, nō est ad propositum, sed procedit ex falso intellectu positionis Auerrois. Non enim ponit gradum primum i geometrica proportionē duplam in dupla proportionē excedere temperamentum. Sed solum eundem excessum primi ad temperamentum, quo secundus primum excedit per solius unitatis additionem. Quod si temperamentum capiatur pro ultima unitate a qua constituitur ad ipsam solam gradus primus est duplus, & eodem modo dici debet de gradibus supra tēperamentum iuicē collatis modo proximi accipiantur, & in hoc intellectu argumēta Arnaldi contra Auerroim non procedunt. nam secundum eius positionē falsum supponit qd̄ nō tantū unus gradus distet ab alio quantum primus distat a temperamento. Nā si hoc sen

lisset Auerrois non posset subſtineri, quod quantū inferior qua-  
litas tēperamentū ſuperat tantum de qualitate oppoſita in gra-  
du ſuperiori poſſet reprimere. Nam ad quoscunq; gradus non  
eandem habet proportionem, quare nec reſpectu cuiuſcunq;  
poterit cōſimilem effectum producere ſicut cōtra ipſum ſupe-  
rius demonſtratiue cōcluſimus ſuppoſitis eius ſūdamētis, quæ  
philosophiæ principiis aduerſantur. Sed forte & ipſe aduerſus  
nos inſurgeret inquiens quo nam pacto eadē primi gradus frigi-  
ditatis medicina poteſt de calida quarti gradus & tertii tantum-  
dem reprimere. ſ. gradum unum cū non eadē reſpectu utriuſq;  
ſeruet proportionē cū tertius ad primum ſit ſupbipartiēs, quar-  
tus uero ad eundē ſuptripartiēs. Ad quod reſpondendum. qđ  
eadem medicina tantum poteſt de fortiore quātitatiue remitte-  
re quantū de inferiori, & minus forti, nō tamen tantū proportō-  
nabiliter. nā medicina frigida in primo ex calida in quarto reſpē-  
ctu tēperamētī remittit ſolū partē quartā, ex medicina uero ca-  
lida in tertio partē tertią, & hoc intelligendū eſt in primis doſi-  
bus utriuſq;. nam tāta quātitas accipi poſſet, quod nihil ſenſibili-  
ter de medicina gradus ſuperioris diminueretur. Et probabili-  
ter quidem ſic cōtingit, quia medicina dicitur tāti gradus reſpe-  
ctu qualitaris habitualis, nō autem reſpectu qualitaris actualis, nā  
forte in hac maius eſſet dubium quomodo tantūdem ab eadē  
ex ſuperiori, & inferiori medicina poſſet deprimi cum ſuperior  
reſiſtat magis actioni alicuius agentis quā inferior, ſicut uero de  
qualitatibus habitualibus cū utraq; miſtione. nō ueluti qualita-  
tes actuales habeant, quāuis una alterā remittat, & forte talis re-  
miſſio ſequitur, nō per actionē qualitātū habitualiū, inter ſe, ſed  
per actionem & paſſionem qualitatum actualium, ad quas ha-  
bituales ſequūtur. Et hoc modo, eidē ſecundum proportionē  
eandem arithmeticā imo idē absolute deprimetur per frigidā,  
in primo ex medicina calida. in quarto & medicina calida, i ter-  
tio, & in hoc qualitas habitualis in medicina compoſita ex ſim-  
plicibus magis habebit rationē numeri producti ex ſubtractōe.

gradus inferioris a gradu superiori, quā habeat rationem qualita-  
tis refractæ ex actione contrariarum qualitatū adinuicē. Quā-  
uis per actionem contrariarum qualitatū sit producta, neque  
forte etiā est necesse, ut quātrū contrariæ qualitates actuales in  
gradibus naturalis latitudinis se remiserint tantum habituales,  
qualitates sese refrangant. forte. n. minorem maior remissio cō-  
sequetur, maiorem minor. nam qualitates secundæ (sicut poni-  
mus) qualitatem illam habitualem, quāuis ex actiōe qualitatū  
primarū eueniant in cōposito inmixto, tamē una habeat aliam  
refrangere secundum rationem numeri subtracti, & a subtrahē-  
te præcedente tamen actione qualitatū primæ, dixi autem  
qualitatem habitualement, qualitatem secundam, quāuis calidum,  
frigidum humidū, & siccum dicantur a medicis et philosophis  
qualitates primæ, propterea quod in medicina est qualitas secū-  
da, quāuis in corpore humano reducta ad actum dicatur quali-  
tas prima. Hæc oīa patent recte speculanti. Aduertendum etiā ē  
quod subtractio a medicina calida in quarto gradu, uno per fri-  
gidum in priō, non est etiā forte necesse, quod superaddita alia  
dosi fiat calida in gradu secundo, quāuis hoc fuisset necessariū  
dicere secundum positionem Arnaldi, nam non tantum una  
dosis esset, sed plus, esto quod esset deducta ad gradum tertiū,  
accepta tantum una dosi talis medicinæ cōpositæ, & calidæ in  
tertio necesse est dicere, quod superaddita frigida in primo re-  
mitteretur ad gradum secundum, cuius rursus accepta dosi, &  
superaddito frigido in primo reduceretur ad gradum primum.  
& sic deinceps. Ponamus igitur figuram huius capituli, ut exē-  
plo pateant, quæ ratione mōstrauimus.

**D**



Qua diximus de remissione medicinae calidae a medicina frigida, e conuerso intelligendum est de remissione medicinae frigidae a medicina calida, & idem intelligimus de qualitatibus passiuis. uidelicet de frigido, & de sicco. quid autem ex frigida & calida in eisdem gradibus fiat, ex proprio capitulo dignosci potest.

Caput sextum de inuentione gradus medicinae compositae ex simplicibus eiusdem qualitatis.


**p** Er praedictam methodum facilem etiam nobis, & clara uiam acquisiimus de inueniendo gradu medicinae compositae ex medicinis eiusdem qualitatis i distinctis tamen gradibus, quauis Arnaldus in hoc accuset

Auerroim, quod fuerit diminutus non tradens determinatam remissionē in ipsis, sed solum per remotionē aliorū graduū docet, qui gradus non oriatur. nam qui fundamēta Auerrois in hac materia recte tenuerit ex amissum retractionis quantitātē assignabit, nec eum mordebit, quod ueluti ignarus pratermiserit. Sciendum igitur, quod tertius gradus caliditatis sunt septem octauui gradus, quarti eiusdem caliditatis, nam gradus quartus super temperamentū est ut octo respectus totius latitudinis tam naturalis quā iusticialis, & prae dicti septē, sunt octauui septē integra, incipiendo a non gradu totius latitudinis. Secundus uero gradus sunt sex octauui eiusdem gradus quarti secundū eandem rationem, & primus gradus quinque octauui eiusdem prae dicto modo intelligendo. E contrario uero tertius gradus frigiditatis est unus octauus caliditatis quarti gradus. Secundus uero frigiditatis duo octauui, primus uero tres, his supradictis dicamus, quod si componatur medicina calida, in primo cum medicina calida in quarto, noticia cōplexionis cōpositae medicinā hoc modo habebitur. Scitum enim iam est, & exploratum, quod cōmitione medicinā frigida in gradu primo cum medicina calida in quarto resultabat calida in tertio. Accipienda igitur sunt gradus caliditatis infra temperamentū in medicina frigida in primo. & manifestū est, quod sunt tres, iam enim diximus, quod primus gradus frigiditatis sunt octauui quinque caliditatis arguatur modo sic. Ex gradibus octo, qui sūt tota latitudo caliditatis gradus tres caliditatis minuunt gradum unū. Ergo gradus quinque qui sunt in medicina calida in primo minus proportionabiliter diminuēt, quā minus habēt de frigiditate diminuente. Manifestum autē est ex regulis arithmeticae, qđ solum diminuēt tres partes quinque partiū unius gradus, diuiso. n. gradu, qui remittitur in partes quinque, si tres gradus totas illas quinque aufert per admitionē quinque partium frigiditatis, quinque gradus tres quantitas tantū tollent per admitionem trium partiū frigidae tantum, Vel clarius dicamus, qđ a nō gradu usq; ad gradum primum frigiditatis supra tēperamentū sunt

quinq; in calido uero in primo sunt tres. Si igitur qñq; ptes frigiditatis diminuunt unū integrū siue unum gradū de medicina calida in quarto, quod integrū, seu qui gradus est unū octauum eius. tres igitur partes remittent de eadē medicina calida in quarto tres qntas eiusdē unius integri, uel gradus quidē unū octauum. Quod supponitur diuisum in prædictas ptes quinq; & hic modus est facilis, & clarus, & seruat in remittēdo proportionē arithmeticam, ut aīa duerrenti apertissime cōstat. Per hāc eandem regulā, scire possumus, si medicina temperata admisceatur medicina calidā in quarto, quantū ex hac diminuetur. Et manifestū est qd quatuor qnte partes per talem admistionē auferūtur, si. n. qñq; hoc est frigidum in prio diminuunt per unū gradum integrum quatuor. i. tēperamētum. diminuūt quatuor qntas secundum regulas arithmeticae disciplinæ. Modo cōsimili, si medicina secundi gradus caliditatis misceatur medicina calidā i quarto, reperietur complexio medicinae ex his composita, qā medicina frigida in primo supra temperamentum hēt ptes quinq; frigiditatis. Medicina calida in secundo supra idē tēperamentum hēt ptes duas frigiditatis infra tēperamentum, & illa dat integrū. hāc igitur dabit duas qntas ptes, si uero medicina calida, ut tria misceatur cū ea, quā est calida in quarto scdm eandē rōnem diminuet quintā unā partem. Eodē modo si medicina eadē calida in secundo misceatur medicina calidā in tertio, diminuet ipsam per prædictas qntas partes. Calida uero in primo qntas tres, tēperata uero quatuor. At uero si coniungatur calida i primo, cum calida, i scdo tres prædictas qntas fortioris remittet, tēperata uero quatuor, & easdem diminuita calida in primo. Rō aut quare plus diminuat gradus secundus caliditatis a gradu tertio, quā gradus tertius diminuat a gradu quarto, & similiter plus gradus primus a scdo, quā scds a tertio. Et amplius etiā tēperamentum a gradu primo quā primus a gradu scdo est, quia scdm gradus frigiditatis inclusa in ipsis fit depressio semper a calido. Et plus & minus scdm proportionem arithmeticam, quā i nūeris

reperitur nō autē depressio fit secundū numerū graduum caliditatis, ex quo in hoc sunt similia, & nullā habent contrarietate, quā igitur gradus tertius caliditatis habet gradum unū frigiditatis, per quē distat a gradu quarto. Gradus uero secundus duos, igitur respectu cuiuscūq; plus caliditatis remittet calidum in secundo, quā calidum in tertio. Et calido in secundo amplius calidum primi gradus, quod ē uincitur a tēperamento. In ea igitur proportionē alterū plus, alterū minus ab uno gradu remittet, in q̄ ipsi se habuerint. Quia igitur calidū in tertio hēt respectu gradus quarti, gradum unum frigiditatis, calidū uero in secundo respectu tertii habet duos, ideo calidū secūdi plus diminuet a calido ī tertio quā calidum in tertio a gradu quarto. Eodem modo dicendū in reliquis, tantū .n. diminuet medicina tēperata a calida in quarto, sicut a calida in tertio. Calida in secundo, & a calida in primo, & similiter calida in primo a calida, ī quarto, in tertio & secundo. Et calida in secundo a calida in quarto & tertio. Sicut frigidū in primo, a calido in quarto tantūdem diminuebat, sicut a calido in tertio, & ī secundo eodē mō in aliis. Ex q̄bus patet, quod ordo depressiōis in proportionibus graduū in medicinis eiusdē qualitatis, & diuersorū graduū est idē cū ordine exaltationis graduum, & eādē seruat proportionē. Ex his ē manifestum est, q̄ gradus nō tantū tres metas habet, sicut nōnulli ponunt, sed saltē metas quinque sicut ex ordinata depressione scdm numerū eiusdē qualitatis ipsi monstrauiimus. Immo nō tantū gradū in tres mansiones partimur, sed in infinitas. Et ut dicit Auerrois sexto colliget, sunt in diuiduorū tot pręparatiōes fixę pp materię possibilitatē, ut eas per signa cognoscere nō possimus. Et primo theoricę cōplexiōnes quo dāmodo īfinitę sunt, ponendę forte tantū sunt metę tres sensu diiudicabiles. Quod si sic habet necessario ponendū quod in cōmistiōe tertii gradus cū quarto eiusdē qualitatis, & in eadem dosi non uariatur meta sensibilis quarti gradus. Quāuis compositum ipsum locetur infra summū situm eius in quo primo constitebatur medicina eleuationis gradus. Secūdu uero

ro gradus ponet gradū quartum in meta scda. Gradus at prim⁹  
eundē quartū infra medium scdæ metæ. Et quēadmodum inter  
gradum, & gradum est æqua proportio, ita etiā ab una meta ad  
aliam, quando per gradus proportionales fuerint productæ, ut  
autem quæ prædiximus pateant subscripta figura sic explicabi-  
mus.



quot enim partes subtrahit medicina inferior a summa, quæ est  
quarti gradus totidē sumit a superiori qualibet, ut tractus i præ-  
dicta figura præsignant. Ad cognoscendum uero, quæ meta sit  
diuide gradum i partes quinque, & ex quintis partibus iudicabis.  
Partiemur. n. qnq; quintas in partes tres, & primas dabimus pri-  
mæ metæ, secundas mediæ, tertias postremæ. Quare subtractio  
per unam quintam partem solum non uariabit metam, nisi po-  
suerimus in infima parte alicuius metæ priorem simplicem me-  
dicinam fuisse positam, Si uero per quintas duas in mediâ me-  
ta gradus locabitur, & eodem mō tu speculare in reliquis.

Caput septimum de cognitione cōuersionis unius medici-  
næ ab altera secundum unam opinionem.

Nquirendū deinceps est, & p̄scrutandū quot doses  
requirat una medicina, ut aliā cōuertat ad sui denotiatio-  
nē, siue fuerit medicina opposita qualitatē, & eiusdē  
gradus, siue distinctorū graduū, & opposita qualitatē,  
siue his modis oppositis. Et demū tam de cōuersione mino-  
ris a maiori, quā ecōtra, & in his quidem forte respondebit aliq̄s  
dicēs suppositū iā ē, qđ iūctis medicinis opposita qualitatū in  
eisdē tamen gradib⁹ sit tēperamentū, si i primis suis dosibus co-  
pulētur. Suppositū ē est, qđ a duabus dosibus medicīa oppo-  
sita q̄litas diminuit medietatē eius, qđ diminuebat ab una do-  
si qbus statibus dicitur, qđ medicīa calida i quarto i una dosi iū-  
cta, cū frigida i quarto sit tēperamentū, ad qđ si supaddatur do-  
sis alterius medicīe cōponentis prouēiet gradus medius cōple-  
xionis qđ debetur medicīe adiūctæ, & totū cōpositū erit in se-  
cundo, qđ qđē probabile illis ē, qā duplicata uirtute agētis sub du-  
plato actio sui cōtrarii, qđ erat ei uirtute ægle. Si igitur frigidū in  
q̄rto potuit calidū i q̄rto reducere ad tēperamentū, calido du-  
plato reducet ad gradū scđm unū, tamē necesse ē dicere qđ me-  
dicinā tēperata ex primis dosibus opposita medicīnæ i q̄rto  
hēt plures doses p̄p̄ea, qđ iā demonstratū ē, qđ medicīa tēperata  
nō pōt i una dosi ultra q̄tuor q̄ntas ptes ab aliquo gradu remitte-  
tere. Hic autē remittit i tēgra duo, q̄ sunt decē q̄ntas ptes, & sic plu-  
res doses hētēt quā duas, qđ si obster q̄spiā dicēs nō ēē possibile  
medicinā tēperatā hēre plures doses, quā sint i nūero partiū cō-  
ponentiū ipsam. ptes uero cōponentes erāt duæ doses tātum.  
igitur medicīa tēperata nō hēt plures doses, quā duas, dicendū  
scđm hāc opinionē, qđ nisi ēēt qđ singulæ cōponētīū hēnt sin-  
gulas doses ad mortificadū, & nō est icōueniēs, qđ ex duab⁹ do-  
sib⁹ medicīnæ i q̄rto fiat medicīa tēpata, q̄ hēat plures duabus  
dosib⁹ eiusdē medicīe tēperatæ, ut puta doses duas cū dimidia.  
Et iō huic tēpatæ addita medicīa calidā i q̄rto dosis altera cōfi-


cietur medicīa calida ī sc̃do, & n̄ erit una dos̃s tantū, sed plures.  
Eodē mō facta medcīa tēperata ex medicīa calida ī tertio. & me  
dicīa frigida ī tertio, deīde superadīcta dos̃s altera medicīa cali  
da uel frigida ī tertio fiet medicina calida uel frigida ī medio  
gradus sc̃dī, q̃a a medicina calida uel frigida ī tertio remouet  
integ̃ unū & dimidiū, quæ sunt q̃ntæ ptes septē cū dimidia. Et  
q̃a medicina tēperata ī una dos̃s hēt tantū a medicina supra ip  
sam remouere q̃tuor q̃ntas ptes, Illa uero remouet q̃ntas septē  
cum dimidia. Erūt igitur duæ doses minus una oētaua pte alte  
rius illarū, & sic medicīa tēperata producta ex q̃rtis gradibus op  
positis plures doses hēt, & plus diminuit a medicina altera ipsa  
rum, quā medicina tēperata cōflata ex tertiis gradibus oppositis  
respectu alterius tantū. Eodē mō necesse est euenire ī medicīa  
temperata producta ex secundis gradibus, addita, n. alteri dos̃i  
utriusuis ipsarū erit medicīa cōposita primigradus, & medicīa  
tēperata, q̃ addita est, erit una dos̃s, & quarta pars sicut medicīa  
temperata producta ex gradibus tertiis oppositis respectu uni⁹  
dos̃s alterius suarū partium minus q̃ntas duas, cū dimidia dimi  
nuit, quā faciat medicina temperata cōposita ex quartis gradi  
bus similiter oppositis ab altera dos̃i alterius suarū partium, quia  
medicina tēperata cōposita habet plures doses, illa, n. diminuit  
tantūmodo per septē q̃ntas partes cum dimidia, Ista uero p de  
cem, quorū differentia est duo & dimidiū. Eodē modo medici  
na tempata gēita ex gradibus secūdis oppositis minus duas q̃n  
tas partes & dimidia minuit ab altera suarū partiū, si illi fuerit sup  
addita, quā faciat medicina tempata ex tertiis respectu unius do  
sis alterius suarū partium, hæc enim q̃ntas partes q̃nq; hoc est ite  
grum unū præcisum, illa uero ultra hoc q̃ntas duas partes cum  
dimidia & erit ī illa ex secundis medicīa temperata dos̃s una,  
& quarta pars. Con similiter posita medicina tempata ex primis  
gradibus qualitatū cōtrariarū, & huic superaddita dos̃i alteri⁹  
earum resultabit medicina dimidii primigradus, quæ per duas  
q̃ntas partes cum dimidia distat ab ea, quæ producta fuerat per

medicinā secūdi gradus, supadditā temperamento facto ex gradib<sup>9</sup> secūdis oppositis, & dosi medicīe temperatæ ex primis gradibus cōflata erunt duæ partes unius dosi & semis, ex quo diminuit duas partes qntas & semis solū eius gradus de quo medicina tēperata in una dosi diminuit quatuor. Et secundū hoc nō erit incōueniēs ex duabus dosibus oppositæ qualitātū in eisdē gradib<sup>9</sup> cōfici medicinā tēperatā unius dosi tātū, uel infra unā dosim sicut dicebatur nō eē incōueniens ex duabus dosib<sup>9</sup> tantū cōponi medicinā temperatā, quæ eratāplius quā duæ doses. Et demū cōsequēter diceret. hęc positio qđ diuersitas hęc accidit pp eleuationē gradib<sup>9</sup>, uel depressiōē. Vbi. n. maior fuerit eleuatio ibi plures resultāt doses medicīe tēpatæ. e cōtrario ubi minor. Vltērius nō oīum medicīarū tēperatæ cōpositæ erit eadē dosi, sed lōge minor in cōflata ex gradibus eleuatoribus q̄ depressioribus. Nā si cōponatur medicīa frigida in quarto cū medicina calida in quarto & dosi utriusq; exempli gratia sit dragma una medicina temperata nō erit duarū dragmarū, sed eius dosi erit scrupuli duo ad producēdū iquā talē actionem, qualē producere debet medicina temperata. nūquā tamē hoc cōpositū ē totū productū ex gradibus oppositis i q̄rto produceret actionē, quæ debeatur medicīe calidæ uel frigidæ in q̄rto gradu sed solū tātō plusaget q̄tō una dosi cū dimidia addita uni dosi medicīe temperatæ solet ad alterā qualitātū trāsmutare secū dū præparationē corporis. Nā prædicta medicina temperata ex quartis ē duæ doses & dimidia, una igitur & dimidia plusaget ultra unā qđ dictū est. Est. n. determinata q̄ntitas medicīe temperatæ, qua multiplicata ad alterā qualitātū accidit secundum qđ in pluribus experientia cōprobatur, ē si medicina temperata fuerit simplex quāto magis incōposita. Et forte in medicina tēperata simplici determinatur minimū & maximū respectu oīum medicīarū temperatæ simpliciu. Respectu uero tēperatæ cōpositæ propriā sibi determinat q̄ntitatem cōposita ex quartis gradibus oppositæ qualitātū. Et aliā propriā composita ex tertiis

gradibus rursus aliā quā ex secūdis, & demū aliā, quā ex primis. Proportio autē eadē arithmetica seruabitur in numero dosum medicinarū temperatarū ex quartis gradib⁹. Ex tertiis ex secūdis & primis oppositis, sicut eadē prorsus q̄ntitas numeralis seruabatur in minori subtrahtiōe tēperatā ex gradibus inferioribus quam superioribus. quādo alteri partiū cōponētiū medicīa tēpata addebatur, & erat semp differentia per duas q̄ntas partes cū dimidia. simili mō cōtinget in dosibus, nā medicina tēperata ex quartis gradibus oppositis plus habebit quā medicīa tēperata ex tertiis quinq; octauas partes, nā doses duæ minus octaua à duabus cū dimidia subtrahā remanēt octauæ ptes q̄nq;. Duæ uero doses cū dimidia erāt medicīa tēperata ex gradib⁹ quartis, duæ uero minus octaua erat tēperata ex tertiis. Eodēq; mō si à duabus minus octaua subtrahatur dosis una, & quarta pars, quā est denominatio medicīnæ temperatæ ex secundis, reli duæ erunt totidē octauæ partes. Si uero ab una & quarta parte subtrahātur unius partes duæ cū dimidia, reliquū erunt prædictæ q̄nq; octauæ partes, sicut ex scientia numerorū plane quisq; assentiet. Vide quomodo differentia est proportionalis ex parte quātitatis subtrahā à medicina temperata respectu alterius suarū partiū. Ita medicīnæ ipsæ temperatæ in dosibus, eadem prorsus seruāt quantitatem. Ibi. n. differentia subtractionis erat duæ q̄ntæ partes cū dimidia, hic uero differētia dosium est q̄nq; octauæ partes. Rursus aduerte si placet, quod quinq; octauæ partes maior pars est unius integri quā duæ quintæ partes adiecta dimidia, nā hæc sūt medietas integri, illæ uero plusquā medietas. In quo etiā admirabimur medicīnā temperatā compositā ex gradibus oppositis superadditi. tā alteri partiū nō solū deprimere medietatē graduū illius, sed ēt unā medicīnā tēpata respectu alterius tēperatæ seruare idē deprimēdo ab altera suarū partiū differentia medi gradus. Duas. n. q̄ntas ptes & dimidia plus deprimat una tēperata ab altera suarū ptiū, quā faciat alia tēperata. Nec dubiū cuiuspiā esse debet, q̄a nō maior sit differentia i eo, qđ subtrahitur quā duæ q̄n-

ta partes cū dimidia, si differentia dosiū in ipsis medicinis tēpera tis est p er qnq; octauas partes. Videretur. n. qđ tāta deberet eē differentia subtractionis, q̄ta ē differentia dosiū ex eo, qđ nos uide mus medicinā i secundo remittere ab opposita tertii gradus duos medicinā uero gradus primi unū tātū, & qualis ē differentia gradus ad gradū i medicinis deprimētib⁹, talis ē differentia q̄ti tatis depressionis unius ab altero. Et sic deberet eē differentia per qnq; octauas unius gradus. Nisi esset qđ medicina tēperata & si i se iētegra aliquā habuerit deniationem tamen alteri superaddita nunquā remittit iēgrū ex quo ad illud cui additur nō hēt oīmo dam cōtrarietatem, neq; necessariū sēper est ex differentia dosi um eādem arguere differentia depressionis, sed solū proportiona lem. Vnde qnq; octauas partes in dosi medicina tēperata cōpo sita respectu alterius suarū partiū nō remittuntur qnq; octauas, sed tātum duae q̄ntae partes cū dimidia. idifferentia uero graduū secus cōtingit. Ponatur aut figura, ut ea, quae hoc loco dicta sūt inspecta figura facilius deprehendatur.

Ad unā dosim suarū partiū




cōsequēter diceret hāc positio, qđ si eadem medicina tēperata  
addideretur nō uni dosi tātū alterius suarū partiū sed pluribus ui  
dendū ē qđ cōtingeret, & p̄rio in medicā tēperata cōposita ex  
q̄rtis gradib⁹ oppositarū q̄litatū, & q̄a ipsa dicebatur hēre duas  
doses cū dimidia, & ab una dosi alteri⁹ suarū partiū dimiūere du  
os gradus, dico scđm hāc uiā qđ tātū dē p̄cise diminuet ā dua  
bus dosib⁹ nisi qđ addēdus ē grad⁹ un⁹ ip̄sis, p̄ additionē dosis.  
nā si cut una pars tātū dicebatur q̄rti grad⁹ duā dicetur q̄nq; gra  
dus hēre scđm existimationē, quis medici nō progrediatur ultra  
q̄rtā. Et sic ā duab⁹ dosib⁹ eiusdē q̄litis in q̄to medicā tēpera  
ta cōposita ex q̄rtis gradibus oppositis i una dosi reducet ad gra  
dū tertiū, qđ si triplicetur dosis dicetur medicā sexti gra dus, aq̄  
p̄dicta tēpata, q̄a erit cōuersa, & deductū erit totum cōpositū  
ad gradū q̄rtū. Eodē mō medicā tēpata ex tertiis gradib⁹ oppo  
sitarū q̄litatū i primis dosib⁹ utriusq; ab altera suarū partiū remit  
tebat gradū unū cū dimidio, ā duabus dosib⁹ remittet tantū dē  
sed illis erit gradus unus additus p̄ multiplicationē q̄titatis & si  
cut denoiabatur ā gradu tertio denoiabitur, ā gradu q̄to. Erit igitur  
totū cōpositū graduū duorū cū dimidio, cui si addatur ter  
tia dosis eiusdē tēperata medicā erit cōuersa, quis ad cōuersio  
nem fuisset sufficiens additio duarū dosiū cū dimidia. Nā tres  
doses terti gradus intelliguntur q̄nq; gradus, ā quibus subtrahendo  
gradū unū & dimidium fieret medicā terti grad⁹ cū dimidio.  
nisi dictū esset, quod quātaunque dosis medicā alicuius gra  
dus non sufficit suā oppositā reducere ad gradū eleuationē quā  
sit gradus medicā deprimētis. Quare sufficiunt ad cōuersio  
nē dosis duā cū dimidia, similiter aut tēpata ex secundis gra  
dibus, si addita alteri suarū partium remittit gradū unum tātū.  
& sit totum cōpositum primi gradus addita igitur duabus dosi  
bus tā erit cōuersa, intelligitur enim per secundā dosim eleuari  
in gradu, & erit totum cōpositū gradus secundū. Idē quoq; pro  
portionabiliter cōtingit de tēpata in primis gradibus addita, n.  
uni dosi tātū erat dimidiū gradus primi, addita igitur duabus iā

erit conuersa. Intelligitur. n. ipsa duplicata augere gradū, sicut igitur temperata à primo gradu nō diminuebat nisi gradus. medietas tē tantundē diminuetur à gradu secundo, & sic cōpositum eēt ī dimidio secūdi, nisi quod doses illæ nō ultra gradum, utriusuis ipsarū possunt temperatam perducere, utraq; aut erat in primo gradu. hæc igitur ad cōuertendū tēperatam erit dosis una & dimidia. Vides ne quo pacto plures doses ex altera suarū ptium requirantur ad cōuertendā temperatā ex q̄rtis gradibus, quā ad conuertendā tēperatā ex tribus. Et ad hāc plusq; ad temperatā ex secūdis. Et rursus ad hāc plusquā ad temperatā ex primis. Nam ad cōuertendā temperatā ex quartis requiruntur tres doses. Ad tēperatā ex tertiis duæ & dimidia. Ad tēperatā ex secundis duæ tantū. Ad temperatā ex primis una & dimidia. Vides ne eēt qđ eadē est differentia subtractionis in gradibus à partibus supadditis tēpametis, quā ē ipsarū dosiū partiū supadditarū pro cōuertendis tēperatis. Plus, n. subtrahebat tēperata ex q̄rtis ab una suarū partiū, quā temperata ex tertiis ab altera suarū. Et hæc ampli⁹ quā tēperata ex secūdis, quā rursus amplius quā tēperata ex primis. Et differentia cōis unius ad suā proximā erat medietas gradus. Ad cōuertendū similiter tēperatā medietas dosis requiritur āplius in altera ptii, quā ē ī quarto, quā ī tertio, nā tres doses alterius ptis cōuertūt tēperatā ex q̄rtis. Duæ uero & dimidia tēperatā ex tertiis, & sic deinceps ut dictū ē. Rō aut est, qđ plus est quod cōuertendū est in tēperata ex quartis, quam in tēperata ex tertiis, & amplius in tēperata ex tertiis, quā in tēperata ex secūdis, & in hac plusquā in tēperata ex primis. Hoc aut cōstat ex dosi uniuscuiusq; tēperatæ ad alterā. Ex his manifestū ē quot doses requirit medicina, ad hoc ut conuertat eā, quā ē similis gradus sed oppositæ q̄litis. Nā illa quæ est in quarto requirit doses quatuor, quæ in tertio tres & semis, quæ in secundo tres, quæ uero in prio duas & semis. Ita ut numero requisito ad cōuertendā tēperatā ex talibus addatur dosis illa, quæ in tēperata præexistit. nā ipsa ē. intelligitur quādo loquitur de tēperata, quæ est cōposita. Prædicta patēt sub scripta figura.

Tem.

Ex quartis ad alterā. Ex tertiis. ad. Ex secundis. Ex primis ad alterā suā. partium. alterā suā. ad alterā suā. ram suarum.



Icetur igitur opposita qualitas ēē cōuersa, si ad datur sē  
d per dosis, quæ intemperata intelligitur. Hac uia non erit  
difficile scrutari quot doses habeat temperata cōposi-  
ta ex oppositis gradibus in qualitate, sed eiusdem dominatiōis  
in pluribus dosibus æqualibus tamē numero. Misceātur enim  
doses tres medicinæ calidæ in quarto cū dosibus tribus medi-  
cinæ frigidæ i eodē gradu, proculdubio resultabit medicina tē-  
perata, cuius dosis tripla erit ad eā, quæ resultabat ex una dosi tā-  
tum utriusque. Illius autē doses erant duæ & semis. Hæc igitur  
habebit doses septem & semis secundum dosationem me-  
dicinæ temperatæ. Quæ doses omnes additæ uni medicinæ ca-  
lidæ in quarto, proculdubio conuertent, cū etiā qnq; sufficiant.  
Nā si doses duæ & semis medicinæ temperatæ ex quartis cōpo-  
sitæ poterāt dosim unā alterius suarū ptiū, gradib⁹ quæ erat in  
quarto reducere ad gradum secundum. Similiter doses quinq;  
quæ sunt eius duplum sufficient conuertere. Hoc etiam patet  
subtrahendo pro singulis dosibus quintas quatuor partes uni-  
us gradus, quatuor enim quinq; uiginti efficiūt, quæ quatuor in-  
tegra sunt, & q̄tuor gradus singulo gradu eorū qnq; pres habēte.  
Eodē modo facta medicina tēperata ex tertiis gradibus qualita-  
tum oppositæ in tribus dosibus singulæ resultabit medicina

in triplo plurimū dosium, quā fuerat medicina téperata ex una  
dosi tātum utriusq; , & qā illi medicinæ doses inerāt minus alte  
rius octaua una . Huic igitur inerunt sex minus tribus octauis.  
Et illa de altera suæ partium poterat subtrahere gradum unum  
& semis . Hæc igitur duplicata poterit conuertere , cum dupla  
ta semper possit illud agere , propterea quod prior ad medie  
tatem suæ latitudinis reducebat . Eodem modo dicendum de  
medicina temperata producta ex pluribus dosibus medicina  
rum oppositæ qualitatē in primo gradu . Semper enim duplū  
ad doses , quæ erāt intemperata tātum ex unis dosibus constitu  
ta medicinæ eiūsdē gradus , sed oppositæ qualitatē potens erit  
cōuertere . Totæ autem doses erunt temperata ex pluribus do  
sibus constituta , quot mōstrabuntur à numero multiplicatiōis  
dosium utriusq; cōponentium , nā semper erit eadem propor  
tio dosium ad doses intemperata , quæ est partium componen  
tium temperatam ex pluribus dosibus ad partes componētes  
temperatam ex unis tantum dosibus utriusq; .


Caput octauum , de consutatione predictæ positionis &  
de eo , quod in hac materia est tenendum secundum propri  
am opinionem unius medicinæ ab altera oppositæ qualitatē .

Aec quanq̃ uideantur subtiliter dicta , & fundamēto  
h probabili sustentata , non reor tamē oīmodam habere  
ueritatē nec firmis esse stabilita radicibus , ut gradatim  
procedentibus demōstrabitur . Primū . n . admissis sup  
positis negatur , quod addita medicina composita ex quartis  
gradibus temperata alteri suæ partium remittat illā usq; ad suæ  
latitudinis mediū , ne hoc ad præmissa sequitur , neq; qđ subiū  
gitur . cogit hoc dicere . Non enī necesse est semper qđ duplicata  
uirtutem agentis , subdupletur actio , sui contrarii , quod erat ei  
uirtute æquale . Nam hoc dato sequeretur quod agens nunquā  
uinceret aliquod passum , cum quo prius fuerit i uirtute æquale .  
q̃tūcunq; ēt multiplicetur , nā in infinitū p medietates diuidere  
tur , qđ eēt sic proportionabiliter remittēdū facta multiplicatio

ne sui cōtrarii. Si uero dicatur, qđ scđm proportionē arithmetica subtractio fieri debet, & sic non erit processus in infinitum. Contra tunc sequeretur contra id quod suppositum est, quod addita dosi alicuius medicinæ additur gradus unus tantum, nā de necessitate adderentur gradus duo ad medicinam calidam in quarto nam factō temperamento ex quartis gradibus qualitatis oppositæ, in quo intelligitur dosis una utriusq; qualitatis, quæ duplatur, necessario cōuincitur esse graduum sex, nan quæ simplex est, habet gradus quatuor, qui subtrahendi sunt ab illis, si debeat medicina duorū graduum permanere, ut dicit positio, nā si secundum positionem addito tantum gradu uno in duplata intelligeretur medicina graduum quinque, à quibus subtractis quatuor medicinæ qualitatis oppositæ quatuor, remaneret gradus unus tantum. Aliud igitur est suppositum, & aliud ex ipso sequitur, quam dicatur. Neq; euitatur inconueniens, ad quod dicta positio ducebatur in medicina temperata, cōposita plures esse doses quā sint in utraq; cōponentium. Nam sequeretur medicinam temperatam esse dandam in minori pondere, quā calidam uel frigidam in quarto. Nec medicinas omnes temperatas esse eiusdē rōnis siue simplices fuerint, siue cōpositæ, nec etiā uidetur rationabile temperamentum cōpositum ex primis gradibus esse minus una dosi, si temperata cætera ex aliis gradibus cōposita plures doses habeant, cum oīa temperata ex unis tantum dosibus pariter supponātur cōposita. Neq; obstat temperamentum unum fuisse ex eleuationib⁹ gradibus cōstitutum, aliud ex depressioribus, Nam temperata oīa æqualiter tēperata dicuntur à quibuscunq; gradibus eorū prouenerit temperamentum. Nō assentio etiā prædictæ positioni, quatenus ponit ipsā temperatam ex quartis medicinā ad qualitatem alterius suarum partium conuerti, si illic fuerit quātitas triplicata, & suo modo de reliquis temperatis medicinis ex aliis gradibus sēriatur. E contrario uero duplata ipsa temperata unam dosim suarū partium tantum posse conuertere. Nam secundum prædictam positionem

nem prima dosiſ ſuperaddita temperatæ potuit addere gradus  
 duos. Ergo ipſa geminata dabit gradus quatuor, & ſic media tẽ  
 perata per duas doſes erit conuerſa. Arguitur. n. per conſimile  
 modũ arguendi, quo arguebatur ſuperius. ſicut. n. una doſis ad  
 dita contrariæ remouebat gradus quatuor, & reducebat ad tem  
 peramentum, & ex hoc ulterius arguebatur. ergo ab ipſa dupla  
 ta remouebit medietatem. Ita e contrario cõſimiliter arguitur  
 una doſis addita tẽperamento ſuperaddit gradus duos, ergo ge  
 minata doſis eidem adiuncta reducet ad gradum quartũ, & ſic  
 duæ poterunt cõuertere tẽperatã, & conſequenter tres ſufficiẽt  
 ad conuertendã contrariã, & nõ erunt neceſſariæ quatuor, ut di  
 cebatur. Comprobatur ſecundũ prædictam poſitionem dicto  
 modus arguendi. Sicut. n. duplata quãtitate ipſius medicinæ tẽ  
 peratæ doſis alterius partis eius conuertitur ad temperamentũ.  
 Ita e contrario duplata doſi, debet temperamentum conuerſi  
 ad æſilitatem doſis ſuperdictæ. Sicut. n. priã doſis ſuperaddita tẽ  
 peramento trahebat ipſum ad gradũ ſecundum, & eleuabatur  
 per duos gradus, & doſis addita per tantũdem deprimebatur  
 utrouiſigitur ipſorũ duplato debet alteræ ad ſui denoiationẽ tra  
 here, qđ tamen eſt ipſoſſibile. ergo & poſitio ad quã hæc ſequi  
 tur. Si. n. dupletur medicina temperata ex ærtis gradib⁹, duæ do  
 ſes itelliguntur. utriuſq; cõponentiũ, ſi ergo alterius ponatur ter  
 tia doſis ſecundum ſuppoſita conſtituetur in gradu eleuationi  
 a quo ſi ſubtrahatur gradus medicinæ non multiplicatæ nec au  
 ctæ per unũ gradum tantũ, quod fuerat temperatũ a tempera  
 mento deſcendet. Si uero duæ doſes alterius accipiantur ultra  
 doſim quã hẽt altera per gradus duos totũ a temperatã, & æſili  
 tate ſeperabitur, & nõ cõuertet, quẽadmodũ dicta opinio ſim  
 pliciter affirmat. Rurſus nõ itelligo quo pacto poſſunt geminæ  
 partes. partes tres æſlis uirtutis ad temperamentũ perducere.  
 quod tamen neceſſe eſt eos dicere, qui temperamentũ ponũt  
 geminatum doſim alterius partis ſuperadditã poſſe cõuertere.  
 eo quod falſo exiſtimarunt temperamentũ ante duplicationem


mentum ipsum superat, uel ipse temperamentum, his suppo-  
tis arguitur ab ipso, licet per medicinā tēperatā additur una pars ca-  
lidity duabus, quæ sunt & continentur in gradu primo calidi-  
tatis. Et per eandem medicinam tēperatam additur una pars frigi-  
ditatis alteri, quæ erat in eodē gradu priō. Ergo multo plus pro-  
portionabiliter additur uni parti frigiditatis alia parte frigidita-  
tis supra iuncta, quia fit duplum eius quod prius erat quā addita  
una parte caliditatis super duabus. Nam ex tribus partibus cali-  
ditatis ad duas, quæ prius erant in calido in primo fit solū trium  
ad duo proportio sequialtera. Et propter hanc rationē inq̃t Ar-  
naldus medicina temperata addita medicinæ calidæ in primo  
de illius caliditate remittit. Nam in calido gradus primi par-  
tes calidæ in duplo sunt ad partem frigidam, sunt enim illæ duæ  
hæc una. Et per cōmitionem temperatæ cum calida in priō fit  
proportio sexquialtera facta cōparatione partium calidæ ad  
partes frigidas, quæ sexquialtera proportio proculdubio minor  
est quā dupla. Hæc ē tota eius sentētia quā ut potui clarius enar-  
raui. Sed huius fundamentū ex antedictis constat esse falsū. Nō  
enī gradus primus supra temperamentum duplā proportionē  
habet, sed solum ut diximus sexquartā sumpto tēperamēto in  
medio iusticialis latitudinis in gradu ut quatuor, uerum autē est  
qd frigiditas, quæ est ut quatuor in tēperamēto in proportionē  
maiori addit supra frigiditatē ut tria, quæ est in primo gradu cali-  
ditatis, quā addat caliditas, ut quatuor eiusdē temperamēti ad ca-  
lidity ut quinque, quæ ē in eodē gradu priō. Nā frigiditas tēpe-  
ramēti ad frigiditatē primi gradus caliditatis proportionē habet  
sexquiterciā, caliditas uero eiusdē temperamēti ad calidity gra-  
dus primi unā subsexquiquartā habet proportionē. Tātū enim  
gradus remittit de una qualitate tēperamēti quātum supra tēpa-  
mētum addit de opposita. Et hoc i prædictis cōparatōibus de faci-  
li itelligitur, qd si rursus uelimus accipe proportōem quā habēt  
ptes calidæ oēs ad ptes calidas primi gradus tātū & proportionē  
quā habēt frigida oēs ptes ad ptes frigidas primi gradus calidita-



Vides quo pacto nūerus dosum alterius pris supra tēpera-  
mentum ad suam ipsius numeri trahit tēperamentū denomina-  
tionem, uides etiā eundē ipsum numex dosiū supra gradū de-  
bitum suæ dosi per gradū cre scere, a quibus omnibus subtrahe-  
re gradus oporteat, qui in opposita fuerint qualitate. Semp.n. q̄-  
litas inferior a superiori contraria tantū remittit quantū illa a tē-  
peramento dēstiterit, cū quidē hæc ita habeant, ut premisimus  
non difficile est uidere quot doses habeāt singula medicina tē-  
perata ex primis dosibus tantū opposita qualitatū in eodem  
gradu. Et manifestum est, quod una dosis tantū, & quarta pars.  
Propterea qđ dosis una tēperata, quatenus talis est per quatuor  
quitas tantū hēt remittere, q̄libet uero hæc tēperata ex primis  
dosibus remouet per integrū ab altera suæ partiū. Igitur de ne-  
cessitate erit dosis una, & quarta pars, & sic rationabiliter euenit  
æqualis numerus dosum, in q̄libet tēperata cōposita ex æquali  
bus dosibus oppo sitarum qualitatū, quāuis non omnis una


dosis temperata cuilibet in pondere sit æqualis. Nam temperata ex quartis minus habet ponderis, quam temperata ex tertiis, & sic in reliquis secundum quod maioris fuerint denotationis in suis partibus componentibus minus in suis dosibus habent pondus. Monstratis prædictis omnibus apertissime declaratur, quanta multiplicatione indigeat medicina aliqua, ut possit ea, quæ oppositæ qualitatis est, & alterius gradus ad suam qualitatem, & gradum conuertere. Dicamus igitur de singulis, & primum quantum opus sit medicinae superiori, ut uertat eam, quæ est inferioris gradus in qualitate opposita. Et manifestum est quod medicina calida in quarto, duplicata tantum dosi medicinam primi gradus frigidam poterit conuertere. nam per additionem unius dosi medicina, quæ erat quarti gradus, usque ad gradum quintum intelligitur fuisse eleuata. A quinque uero gradibus subtracto eo gradu quem frigida medicina habet, medicina calida in quarto relinquitur, ut uero eadem ipsa in sui naturam transmutet frigidam in secundo triplari debet, & intelligitur esse graduum ut sex, a quibus subtractis gradibus duobus medicinae frigida in secundo, quartus gradus caliditatis relinquitur. Si autem ea, quæ est tertiæ gradus debeat oppositam transmutare doses quatuor necessariae sunt. nam ad septimum usque gradum eleuata intelligitur a quo detracti gradus duo ad eisdem penitus gradus quatuor peruenitur. Eadem ratione, ut ea quæ est quarti gradus eam conuertat, quæ totidem gradus habet doses quinque oportet alterius accipere. intelligitur enim gradus octo habere a quibus quatuor oppositæ medicinae gradus auferuntur, & reliqui fiunt gradus quatuor totidem doses, & eadem ratione requirit medicina calida in tertio ad conuertendum frigidam in primo, & frigidam in secundo ad alteram enim duas tantum, & intelligitur quatuor graduum a quibus una subtracto id efficitur, quod prius. Ad alteram uero doses tres, & intelligitur, ut quinque a quibus subtractis gradibus duobus relinquitur medicina calida in tertio. sicut prius. Ad conuertendam uero frigidam, in tertio requiruntur doses quatuor

& existimantur, quod sint gradus sexa quibus subtractis tribus,  
 quæ sunt in dosi opposita qualitas & gradus auctæ persistit. Eo-  
 dem modo calida in secundo ut idem agat de frigida i primo.  
 duas tãtũ requirit .nã efficitur calida, ut tria uirtualiter a quib⁹  
 subtracto uno in den ominationem propriam concrescit. Tres  
 uero doses, ut frigida i n secũdo permutet eandẽ in secundo ca-  
 lidam necesse est habere. nã d quartũ usq; gradum perducitur,  
 a quo gradus duos subtra her e, oportet, & totidem relinquere.  
 Aduerte in prædictis medicinã, quæ multiplicatur incipere à  
 secunda dosi augere gradum, per primã, n. in propria tantũ sui  
 gradus denominationem persistit supra quã, quot fuerint doses  
 additæ tot gradus intelliguntur adiuncti. Rursus aduertas quæ-  
 so eum semper numerum ad conuertendũ requiri supra unam  
 dosim medicinæ superioris per quem denominabitur medici-  
 na gradus inferioris. Prædicta autem ut apertissime pateant sub-  
 scripta figura manifestissime monstra ntur.




Caput nonum, quod respectu eiusdem termini minus re-  
quit medicina superior quam inferior, & quod in hoc serua-  
tur proportio.

Ecce mirum si tot doses requirit medicia superior ad  
conuertendam medicinam inferiorem ad gradum  
suæ qualitatis, quot medicina inferior, ut ad suū gra-  
dum perducatur. Sicut enim ad conuertendum fri-  
gidum in primo ad quartum requiruntur doses duæ  
eiusdem quarti, totidem tertii requiruntur, ut conuertatur ad ter-  
tium, & totidem secundi ad secundum, & totidem primi ad pri-  
mum. Nam altius eadem medicina eleuatur per medicinam  
quarti gradus, quam per medicinam gradus tertii, & sic successi-  
ue. Si enim ad eundem terminum, per superiorem & inferio-  
rem deduceretur proculdubio esset minor quantitas medici-  
næ gradus superioris, quam medicinæ gradus inferioris, quod  
operæ precium sic existimo discutiendum. Duæ doses quarti gra-  
dus caliditatis perducunt medicinam frigidam in primo ad quar-  
tum. Una dos ad tertium, quod patet per subtractionē unius  
gradus ab una dosi. media igitur dos ad secundum, & quarta  
pars ad primum perducet. Eodem modo doses duæ gradus ter-  
tii eandem frigidam in primo perducunt ad tertium, una uero  
perducet ad secundum, dimidia ad primum, & quia doses duæ  
gradus secundi medicinam ipsam frigidam in primo perducunt  
ad secundum, una tantum dos perducet ad primum, quæ ue-  
ro est in primo, requirit doses duas. Quare patet quod respectu  
eiusdem termini minus requirit medicia superioris gradus, quā  
inferioris, ut patet infra scripta figura.



Cali.in.ii.

Cali.in.i.



Cali.in.iii.

Cali.in.iiii.


Si quis diligenter aduertit inspiciet, quod in præscripta figura seruatur proportio non solum unus gradus ad alterum in com paratione ad eundem effectum, sed etiam eiusdem ad se ipsum in comparatione ad diuersos consequenter se habentes. eadem uia quātum requiritur, ut medicina secundi gradus frigiditatis perducatur ad singulos gradus caliditatis perscrutari possumus. Nam quia medicina calida in quarto frigidam in secundo in se

E iiii

conuertit per doses tres. Per doses duas reducet ad gradum tertium, intelligitur enim ut quinque à quibus subtractis duobus per medicinam frigidam in secundo remanent calida in tertio. Per unam autem dosim calida in secundo constituitur, per dimidiam uero dosim in gradu primo. Calida uero in tertio, quia per doses tres in suam denominationem reducit, per duas in calidam in secundo, per unam uero calidam in primo, sicut patet ex subtractione graduum medicinæ inferioris à numero graduum medicinæ superioris. Si autem accipiat calida in secundo, quia ut conuertat frigidam in secundo requirit doses tres, si eius accipiantur doses duæ, tantum erit medicina calida in primo. Quia uero medicina calida in quarto, ut conuertat frigidam in tertio, requirit doses quatuor, ut eandem in caliditate gradus tertii, transmutet doses tres sufficiunt. Duæ uero ut ad caliditatem secundi perducatur, una uero ad caliditatem primi. Calida autem in tertio, ut eandem per eosdem gradus infra se transmutet requirit doses tres, & doses duas, per primas .n. transmutat ad caliditatem secundi gradus, per alteras uero ad caliditatem primi. Per quatuor enim doses poterat in sui conuertere complexionem & gradum. De calida uero in secundo non difficile est cognoscere per quatuor enim doses in se poterat conuertere, per tres igitur ad gradum primum perducet, quod clare constat augmentibus gradum per multiplicatas quantitates, de inde subtractis gradibus, qui medicinam denominant, quæ in una tantum dosi accipitur, & propterea quia calidum in quarto per doses quinque conuertebat dosim unam medicinæ frigida in quarto, necesse est dicere quod per doses quatuor ad gradum tertium caliditatis trahat per doses tres ad gradum secundum, per doses duas ad primum, quæ omnia exemplar figura insinuantur.

Calida in quarto.

Calida in tertio.



Calida in secundo.

Vides ne quo pacto hac uia eisdem principiis perueniam⁹ ad ordinatos gradus oppositæ qualitatis per ordinatam dosiū appositionem, quod si quis uoluerit nō ad oppositā qualitē

transfere per ordinem graduum, sed solum ordinatam graduum  
 um detractionem efficere non illi facilis & artificialis deerit mo-  
 dus. Si. n. uolumus medicinam frigidam in quarto per calidam in quarto ad  
 frigiditatem tertii gradus remittere poterimus facile & doctrina-  
 li uia dignoscere hoc pacto. Dosis una medicina calida in quarto  
 reducit frigidam in quarto ad temperamentum, ergo tres quar-  
 te partes eius eandem reducent ad frigiditatem primi gradus  
 & duae quartae ad frigiditatem gradus secundi, una quarta autem  
 ad frigiditatem tertii. Si enim tota dosi diuiditur in quartas qua-  
 tuor, quae simul sunt superae habet gradus quatuor, ita ut singulis  
 quartis debeatur proprius gradus. Acceptis igitur tantum quar-  
 tis tribus illius dosi erit medicina calida in primo acceptis ue-  
 ro duabus, calida in secundo, accepta autem una calida in ter-  
 tio, ad frigidum autem in quarto, habet medicina calida in ter-  
 tio tres caliditatis gradus, & ad eandem duos calida in secundo,  
 unum uero calida in primo. Praedictae uero tres quartae partes  
 duae quartae, & una quarta unius dosi calidae in quarto, singulae  
 uirtute aequales sunt gradibus tertio secundo & primo, tres enim  
 quartae quarti gradus potestate sunt, gradus tertius duae gradus  
 secundus, una primus igitur ad eandem frigidam in quarto quar-  
 te partis medicina calidae in quarto proportionabiliter se habet  
 sicut sub sequenti figura monstratur.

Calidam in quarto quomodo per gradus remittat frigidam in quarto

Per unam dosim

Temperata per tres quartas

Fri-

gida in primo.

gida in tertio.

Eodem modo si frigidum tertii, uelimus per gradus decreſcentis ſuæ qualitatis ante quam ad gradus qualitatis oppoſitæ perdu-  
catur procedendum erit nobis per tres quartas, medicina calida in tertio, ſit temperamentum per duas in primo, per unam in ſecundo. eodem modo conſiderandum quomodo ex medicina calida in tertio, fiat remiſſio & dicendum quidem eſt, q̃ in unis doſibus temperamentum efficitur, additis igitur duabus tertiis unius doſis uni doſi alterius ad gradū primum eiſdem qualitatis perducet in qua prius à tribus denominabatur. Addita uero una tertia tantum ad gradum ſecundum. Duæ enim tertiæ unius doſis medicinæ tertii gradus, ſunt uirtute integrum unum & una doſis integra medicinæ calidæ in ſecundo, quæ frigidam in tertio ad primum uſque gradum perduxiffet. Vna uero tertia eiſdem calidæ in tertio, una doſis eſt medicinæ calidæ in primo, quæ ſimiliter frigidam in tertio, ad gradum ſecundum perduxiffet. Et aduertendum q̃ una quæque doſis tanti uel tanti gradus in tot partes ſecanda eſt per quot gradus ſuſcipit denominationem ut uni cuique gradui correfpondeat in doſi pars proportionalis. Quia igitur medicina calida in quarto, gradus habet quatuor, in quatuor quoque partes diuidenda eſt. Calida uero in tertio, in partes tres, quantum etiam facit medicina quarti per unam, uel duas ſui quartas partes unius doſis tantum idem facit calida in tertio, per unam, uel per duas ſui tertias, ſicut conferentibus ſequentem cum precedenti figurâ licet de facili conſpicere.

Calida in tertio. quomodo per gradus remittas frigidam in tertio.

Per unam dosim

Temperata per duas tertias.

Ad gra-

dum primum. Per unam

Ad secundum.

Nec admirari oportet tantum enim uirtute continet una quarta medicina calida in quarto quantum una tertia medicina calida in tertio, & una medietas calida in secundo, nam si tota una dosis est calida in gradu secundo, eius medietas erit calida in primo. addita igitur frigida in secundo, ad frigidam primi gradus perducet, si quidem tota dosis poterat per gradus duos remittere, & ad temperamentum usque deprimere, sicut ex naturali et philosophia satis monstratum arbitror, per hanc rationalem, methodum poterit unusquisque depressionem ordinatam uniuscuiusque medicinae per suam oppositam assignare, siue eiusdem fuerint gradus siue non. Modo in eas partes secetur per quas facta fuerit denotatio. Nam medicina calida in tertio potest frigidam in quarto ordinatam remittere, integra enim ad gradum primum, duae uero tertiae ad gradum secundum, una uero ad gradum tertium eodem modo tu considera in reliquis. De conuersione igitur medicinae inferioris & oppositae qualitatis a superiori Et de ordinata remissione medicinae oppositae qualitatis haec dicta sufficiant, e contrario uero de conuersione medicinae superioris ab inferiori deinceps dicendum.

Caput decimum de confutatione cuiusdam positionis de conuersione medicinae superioris & de sensu per gradus eiusdem per applicationem medicinae inferioris in opposita qualitate.

Varamus igitur & perscrutemur diligenter quot doses medicina frigida in primo gradu requirat ut calidam in quarto ad frigiditatem primi gradus conuertat. Et similiter calidam in tertio, calidam in secundo, calidam

à primo. Et rursus inuestigemus, quo pacto per medicinam frigidam in primo calidam in quarto remittamus ad caliditatem tertii, caliditatem secundi, ad caliditatem primi. Eodem modo descendamus per gradus medicine calidam in tertio, & per gradus calidam in secundo, quibus quaesitis forte quis existimabit satisficere, si eorum quae praedicta sunt meminerimus. Dictum est .n. quod multiplicata dosi multiplicatur gradus. Tantum igitur dosim multiplicabimus medicine frigidae in primo, quod tot gradus habebimus quot in medicina conuertenda inuenti fuerint. Et tunc medicinam temperatam per compositionem efficiemus cui addita dosi quanta medicina frigida in primo quas doses intelligemus esse quinque graduum frigiditatis, & à quibus si subtrahatur gradus quatuor caliditatis, quae erant in medicina calida in quarto necessario totum compositum erit frigidum in primo. Et sic ad conuertendam medicinam calidam in quarto, in una dosi ad frigidam in primo necesse erit accipere doses quinque medicine frigidae in primo. Ad conuertendum uero dosim unam medicine calidam in tertio, requiruntur doses quatuor eiusdem medicine frigidae in primo. Intelliguntur .n. gradus quatuor, à quibus subtractis gradibus tribus medicine calidam in tertio, reliquum fiet frigiditatis gradus unus. Ad conuertendum uero calidam in secundo, requiruntur frigidi in primo doses tres à quibus subtractis gradibus duobus, unus frigidus & idem primus. Eadem prorsus uia procedendum, ut frigida in secundo & in tertio conuertantur medicinam calidam in quarto, & suo modo de reliquis gradibus sicut per figuram hic positam demonstratur.

Ut medicina frigida in primo, secundo, tertio, quarto, calidam conuertat in quarto, tertio, secundo, & primo.

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Per quinque doses | Calidam in quarto  |
| Per quatuor       | Calidam in tertio  |
| Per tres          | Calidam in secundo |
| Per duas          | Calidam in primo   |

Vides ni fallor medicinam gradus inferioris ad cōuertendā medicinam superioris gradus supra numerū graduū superioris medicinæ tot gradus supaddere per quot medicina inferior nominabatur sicut superius ad conuertendū medicinā inferiorem dicebamus medicinā superiorē ultra primā dosim tot supaddere quot est numerus graduū medicinæ inferioris. Videamus rursus de conuersione aliorū inferiorū graduum respectu superiorum & dicamus qđ medicīa frigida in secundo ut conuertat medicinā calidā in quarto, requirit doses quinque. nā intelligentur frigiditatis gradus sex, à quibus subtractis caliditatis gradibus quatuor erit medicina frigida in secundo. Ad conuertendam uero calidam in tertio doses quatuor, intelligitur enim ut quinque calidam uero in secundo doses tres, & intelligitur ut quatuor, calidum uero in prio p duas semper, n. numerus gradus medicīæ cōuertentis cōputatur. Et numerus medicinæ cōuertendæ supadditur. Simili mō si per frigidā in tertio uelimus cōuertere calidam in quarto accipiendæ erūt frigiditatis doses quinque, si uero calidū in tertio doses quatuor, calidum in secundo, doses tres, calidū in primo doses duas, ppter cōsimilē rationem quā prædixim⁹. & ne sepius nos oporteat repetere, uide ī supradicta figura, quæ uerissima ratione monstrauimus. Quēadmodū in conuertēdis medicinis inferioribus à superioribus tot doses regrebātur in utraq; superiorū si futura erat cōuersio medicinæ inferioris ad gradū propriū utriusq;. Nā & calida in quarto & calida in tertio ad cōuertendum frigidum in primo, requirebat doses duas tantū, similiter requirit medicina frigida in secundo, & frigida in tertio, pro cōuersione utriusq; prædictorū, & eadē rō, quæ ibi assignanda est, habet .n. altera ad superiorem gradū eleuare, & conuertere, & quanto est altera fortior tanto plus habet agere, & ideo æquales doses requiruntur, ubi uero idem sit actionis terminus pauciores doses una quā altera habebit, Rursus sicut superius facto temperamento ex dosibus oppositarū qualitātū deinde addita dosi alterius cōuerterebatur ad primū gradū, duabus uero ad secūdū,

& sic deinceps eodē mō factō temperamento per doses quatuor, frigidi in primo cū calido in quarto in una dosi, deinde sup addita dosi una frigidi in primo, totū efficietur frigidum in primo qđ patet ēt subtractis gradibus qtuor ā gradibus qnq;. Eodē mō tu specularē in reliquis. Sed mirabile quid dicis qđ nō probabile est, qđ factō temperamēto ex una dosi medicīnæ calidæ in quarto, cū quatuor dosibus medicīnæ frigidæ in primo una dosi medicīnæ calidæ in quarto, quæ ēī quadruplo potētior, quā dosi una medicīnæ frigidæ in quarto solū possit ad gradū unū caliditatis pducere, sicut superius satis est demonstratum. Et dosi una medicīnæ frigidæ in primo possit ad tantum gradum frigiditatis perducere. Ad quod forte dices, quod medicīna frigida in primo reducit prædictum temperamentum ad frigiditatem in primo nō ratione unius dosi tantum sed ēt ratione, ceterarū dosiū, quæ sunt quatuor, sicut calida in quarto agit & reducit ad gradū primū caliditatis rōne alterius etiā dosi, quæ in tēperamento intelligitur. Et rursus in eo qđ est agere secundum unū gradū nō differt medicīna primi gradus ā medicīna quarti gradus, sed secūdū aliā rōnē cum utraq; possit agere secūdū virtutē unius gradus. Differunt autē qđ quæ ē quarti gradus pōt per quatuor gradus agere nō multiplicata dosi, quæ uerō est primi grad⁹ nō, nisi multiplicetur quēadmodū patet si ex ipsis simul iūctis fieri debet tēpamentū. Quod si dicatur supposito temperamēto, addo qrtā partē unius dosi medicīnæ calidæ in quarto. Et manifestū est secūdū prædicta qđ quarta pars medicīnæ calidæ in qrtto est calida in primo. Reducet igitur tēpamentum ad calidū in pñio. Sicut dosi una medicīnæ frigidæ in pñio idē poterat reducere ad frigidū in primo, qđ si admittatur, addo quartas duas partes eiusdem medicīnæ calidæ in quarto, quæ quia dicebātur calidæ in secundo reducēt ad caliditatē secundi gradus & tres supadditæ ad caliditatem tertii. Quatuor uero quartæ ad caliditatē qrti, & sic doses duæ medicīnæ calidæ i qrtto poterunt doses qtuor medicīnæ frigidæ in pñio ad caliditatē gradus qrti

cinam calidam in secundo, & iuxta prædeterminata quintas  
duas partes dimittit, & sic nascitur medicina calida in quarto,  
minus tribus quintis. Et huius accepta dosi cum qua miscetur  
calida in primo remouens quintas tres partes, & sic fit medicina  
calida in tertio, minus una quinta parte. quo facto quid subtra-  
hat quod deerat reliquū facta mistione calidi in secundo. à reli-  
quo quod erat facta mistione calidi in tertio, uidendum est. Et  
ab eo toto quod erat reliquum unius dosis facta mistione cali-  
di in primo subtrahendū est. Et quod relinquitur additur cali-  
dæ in tertio, minus una quita parte. Et siquidē eit eiudem cō-  
plexionis, & gradus non est mistio, sed appositio. Si uero sit in-  
fra gradum tertiu minus quinta parte subtrahendum est. Et de  
mum uidendū quod nascitur per subtractionē illud est quasi  
tum in medicinis eiudem qualitatis. Si uero fuerint distinctarū  
qualitatum omnes eiudem qualitatis secundum ordinem cō-  
stituentæ sunt, & à maiori subtrahendum est per ordinem ut  
explicuimus, & hoc facto ex utraq; parte uidendū an medicīa  
composita ex calidis solum in æquis dosibus accepta sit inten-  
sioris gradus quam cōposita ex solis frigidis. Et tunc gradus in-  
ferioris subtrahendi sunt à gradibus superioris sicut in simplici-  
bus diximus, eandem enim utrobique ratio est & facta depressio-  
ne secundum prædictos canones habebitur gradus medicīnæ  
compositæ.

Caput sextum de solutione cuiusdā obiectionis Arnaldi ad-  
uersus Auerroim de multiplicata quātitatē simplicis medicīnæ  
Non est prætereundum hoc loco quod Arnaldus ad-  
uersus Auerroim sapius repetēdo inducit quod quā-  
titas duplata alicuius medicīnæ nō augeat super gradū  
naturalem ipsius gradum alterum, propterea qd me-  
dicina est uniformis per totum quantacunque fuerit quantitas  
eius, nec magis calida est aut frigida intensius sed forte quidem  
extensius. Inquit enim pueros quosdam & adultos multam  
quantitatem mellis comedisse, qui tamen nullam malā discrasī

am consecuti sunt, cum tamen plures quam quatuor doses comedisent. Sed nō aduertit hic hō plurima quæ animaduersione digna censentur. Primum quidem quantum ex parte medicinæ in seuerum est quod eadem in quantiscunque partibus est intensio, modo formam illam sibi naturalem habuerint ad quam sequitur qualitas illa habitualis penes quam medicinarum gradus distinguuntur, sed potest medicina ad aliam cōferri, & ad corpus humanum. Et utroque modo est differentia in gradu intensiōis nam minor pars quam sit dosis nō potest tantum medicinam oppositam alterare quantum si fuisset dosis una. Et si rursus fuisset quantitas maior quam dosis fortius alterasset nisi forte una dosis oppositam conuertisset, tunc enim maioris quæcunque quantitas nullam intensiorem qualitatem potuisset inducere. Velocius tamen idem gradus qualitatis fuisset à maiori quantitate productus quam à minori, quando tamen nondum prouentum est ad conuersionem semper maior quantitas intensiorem gradum producit. In respectu uero ad corpus humanum semper maior quantitas intensiorem producit qualitatem quousque uita corpus derelinquat. Pro solutione uero eius quod obiicit Arnaldus sciendum differentiam esse inter medicinam absolute & cibum medicinale, multiplicatio enim quantitatis in medicina absolute quæ cibus non est proculdubio secundum Aueroim gradum multiplicat sicut manifestō signo concludit quod superius induximus, & non solum extensiuè magis alteraret sed etiam intensiuè. Et forte etiā medicina quæ cibus est eodem modo agit & per multiplicatā quantitatem et gradū multiplicat quauis modus alius dosandi sit in cibo medicinali & in simplici & pura medicina. Nam quæ est pura medicina calida in secūdo nō habebit pro prima eius dosi uncias duas quæadmodum habet mel quod est cibus medicinalis sed forte draginas duas. Præterea dicitur, quod cibus quilibet medicinalis qui est respectu alicuius corporis tanti gradus si eius dupletur quantitas in eodem corpore producet in

eodem corpore qualitatem per gradum intensiorem. Neque ea experientia quam inducit Arnaldus monstratur contrarium. Potest enim contingere ex discrasia corporum ad oppositam qualitatem, quod talis medicina non esset respectu eorum dicenda calida sed forte temperata, quod uel eos ad temperamentum perduceret, uel eos in temperamento confirmaret. Potest rursus & aliud contingere, ne assumptione mellis pueri, & adulti aliquā discrasia incurrerit, & est qđ ipsi fuissent eiusdē qualitatis & gradus per eandem autem qualitatem & gradum regimen habetur conseruatiuum & non alteratiuum. ratione enim prędictorū cibus absolutus esset, & nō magis læderet eos, quā cibus naturalis in corpore temperato. nam quemadmodum habetur in secundo artis parua calidiora calidioribus frigidiora frigidioribus indigent adiutoriis, & loquitur Galenus de regimine conseruatiuo quare etc.

Caput septimum quo pacto gradus quatuor assignantur in medicinis respectu corporum distemperatorum.

q Via respectu corporis humani temperati medicina omnes accipiunt gradum, qui multiplex est propter uarias operationes quę in corpore temperato ab illis producuntur. alia est enim immanifesta alteratio i prio occurſu, quę primū gradū efficit, alia uero manifesta quę secū dum. Alia rursus occulta corruptio, quę tertium. Alia manifesta, quę quartum gradum denominat. Nō ab re dubitabit aliquis, an i corporib⁹ naturaliter lapsis iidē sint gradus cū manifesta eadem operationes reperiātur. Nam respectu corporis naturaliter lapsi medicia dicitur temperata quia quādo comeditur ex ea quantitas, quę nō est sensibilis cōparando eam quantitati partium dissolutarum a corpore tunc nō inducit in corpus rem extraneam, non tamen homo concedit de ea quantitatem sensibilem quemadmodum de cibo cui uerius at

tribuitur nomen temperantiæ cum ponat naturales partes cibati. Et est in specie partis dissoluta. secus uero in mediam quis enim ponat naturales partes cibati, tamen illa pars non est in specie partis dissoluta & habet in se partem actiuam & alteratiuam. ideoq; cum superuenit agrotationi contraria illa operatio uocatur curatio ut dicit Auerrois in libro colliget. Difficile est etiã inuenire medicinam temperatam in operationibus omnibus. Respectu etiã eiusdem corporis naturaliter lapsi inuenitur medicina quæ immanifesta alteratione eum alterat, quæ dicitur esse gradus primus. Et quæ manifesta dicitur gradus secundus. Eodem modo de immanifesta & manifesta corruptione, quæ gradum tertium, & quartum constituunt. Manifestũ autem est qd non eadem est medicina temperata respectu corporis temperati & respectu corporis naturaliter lapsi, neq; eadem in primo gradu respectu utriusque, & sic de cæteris gradibus. Pro huius autem notitia dicendum probabiliter ui detur quod ab optima sanitate contingit labi per gradum & per graduum mansiones. supposuimus enim in prioribus omnem gradum magnam habere latitudinem & mansiones plures, sed tres quæ forte sunt tantummodo sensibiles. Si igitur corpus labatur ab optima sanitate per primam mansionem primi gradus dicitur insensibiliter labi & incipit denominari corpus salubre ut multum. Si uero per duas mansiones primi gradus dicitur fieri neutrum, ut multum uersus salubria. Si uero in tertia mansionem primi gradus dicitur fieri corpus neutrum, ut multum uersus agrotabile. Si uero per primam mansionem secundi gradus erit neutrum simpliciter. Et si per secundam eiusdem fiet agrum ut multum. Si uero per tertiam mansionem secundæ erit agrum simpliciter. Si uero per primam mansionem tertiæ labitur ad agrum ut nũc & iam agrotat. His suppositis diuisionibus corporum non est difficile uidere quæ unicuique corpori naturaliter lapsi sit medicina tem

perata, & quæ primi gradus & quæ secundi, & sic deinceps si  
conſimilis fiat diuiſio medicina cuius diuiſionis membra con  
ferantur diuiſioni prædictæ de corporibus. Dicamus ergo quod  
ſi medicina temperata ſimpliciter eſt illa, quæ corpori ſalubri ſim  
pliciter talis exiſtit, quæ ab ea lapſa fuerit per primam manſionem  
gradus primi, erit temperata reſpectu ſalubris ut multum. Quæ  
uero per ſecundam erit temperata reſpectu neutri ut multum uer  
ſus ſalubria. Et quæ per tertiam manſionem eiſdem erit tempe  
rata corpori neutro, ut multum uerſus ægra, & quæ conſtituta  
fuerit in prima manſione gradus ſecundi, erit temperata corpo  
ri neutro ſimpliciter. Et quæ ſecundam habuerit manſionem gra  
dus ſecundi, temperata erit reſpectu corporis ut multum ægri,  
quæ uero in tertia fuerit temperata cõſebitur in reſpectu ægri ſim  
pliciter & quæadmodum prima tertii gradus meta in diuiſio  
ne corporum conſtituebat corpora ægra, ut nunc etiam ægro  
tancia ſimilimodo eiſdem tertii gradus meta prima in partiti  
one medicina reſpectu nullius corporis erit medicina tempera  
ta, ſed reſpectu ægri ſimpliciter erit medicina primi gradus. Se  
cunda uero eiſdem meta erit gradus ſecundi, tertia uero me  
ta erit gradus tertii. Medicina uero gradus quarti, in quacunq;  
meta erunt medicina mortifera reſpectu corporis ægri ſimpli  
citer cum corpus hoc inter cætera corpora ſit naturaliter debi  
liſſimum. Aduertendum eſt quod tertia meta gradus ſecundi  
ſola non erit gradus primus ægri ut multum nec prima tertii gra  
dus, erit ſecundus gradus eiſdem nec ſecunda tertii, erit gra  
dus tertius. Nam ſequeretur quod per metam tertiam tertii cor  
rumperetur per illam enim ſortirentur gradum quartum. Sed  
aduertendum quod corpora quãto magis naturaliter lapſa fue  
rit a temperamento tanto minor portio graduum medicina  
rum reſpondentium ipſi temperamento ſufficit ad faciendum

gradum corpori lapsa. Si igitur prima mera quarti gradus ē pro gradu quarto corpori ergo simpliciter aliqd illa intensius cor-  
respondebit pro gradu quarto corpori ægro ut multum. Et sic de aliis corporibus naturaliter lapsis dicatur. Ita ut omnia corpora gradum quartum attingant. Sed hoc quidem magis illud uero minus. Aduertendum & illud est quod quēadmodum corpora naturaliter lapsa per modos octo lapsa esse contingit aut enim per calidum, aut per frigidum, aut per humidum, aut per siccum. Et rursus aut per calidum, & humidum, calidum, & siccum, frigidum, & humidum, & frigidum, & siccū. Vno quoque eorum existente aut sano ut multum aut neutro ut multum uersus sana aut neutro ut multum uersus ægra aut neutro simpliciter aut ægro ut multum aut ægro simpliciter ita proportionabiliter medicina his corporibus respondens aut est lapsa à temperamento per qualitatem unam simplicem aut plures & duplicem. Et secundum has quatuor gradus uariantur nec dubitandum tam in corporibus quam in medicinis lapsum esse simplicem quauis Auerrois hoc neget, nam in corporibus potest per tempus esse discrasia ad calidum atē quam discrasia ad siccum secum sociarit. Eodem modo de frigido dicatur respectu humidi in medicina uero quāuis eius cōplexio actualis non uarietur & esset composita & non simplex tamen qualitas habitualis quæ ad actum reducitur per calorem humani corporis aliquando potest esse tempata secundum unam qualitatem & non secundum alteram & sic habebit & ipsa discrasiam simplicem. Non est autem facile per rationem cognoscere medicinas cuiusuis gradus respectu cuiuscunque corporis. Nam in his rebus experientiæ habent locum magnum ut testatus est Auerrois non solum enim respectu corporis in se uariabitur medicinæ proprietas, sed respectu diuersorum membrorum. Nam medicina, quæ facit saniem in testiculis non facit saniem.

in aure. Oportet igitur medicum diligenter aduertere ut ea, quæ ratione manifesta nõ constant sibi experientia pateant maxime cum in his locum experientiæ habeant, ut plerunque repetit Auerrois.

Caput octauum, quo pacto contraria in eadem medicina dicantur esse hoc quidem secundum magis, illud uero secundum minus.

Via in prædictis inuestigantes complexionem medicinæ compositæ ex simplicibus supponebamur in simplici medicina partes calidas esse & partes frigidas secundum tamen magis, & minus quod per denominationem medicinæ monstratur, ne quis in hoc dubitaret quomodo contraria simul esse possint dicendum aliquid est & similiter quo pacto ex medicinis compositis simul producantur contrariæ operationes. Nam componētia, aut habent æqualem uirtutem aut non, si habent æqualem uirtutē ex ipsis fiet rēperamētum iuxta ea, quæ prædeterminauimus. Si autem alterum fuerit fortius uincet oppositum, & eius operationem in corpore fieri non permittet, & sic contrariæ operationes in humano corpore non apparebunt. Prima harum difficultatum ita soluitur secundum Auerroem in libro colliget. Non existimandum est contraria esse simul actu in medicina aliqua simplici uel composita. neq; etiam pura potentia, tunc enim nullius contrariorum fieret actio in humano corpore, sed esse ibi medio quodammodo inter potentiam & actum. Immo possibile est quod in multis corporibus cōsimilibus dissoluantur partes componentes, in quibus postmodum inveniuntur actu qualitates illæ cōtrariæ, quæ primo in composito cōsimili tantummodo erant medio modo inter potentia, & actū

neque sufficiens fuisset in solutione huius difficultatis, dicere in sensibus simul & semel recipiuntur contraria, sicut album, & nigrum in pupilla, & similiter calidum & frigidum in, commistione aquae feruentis, & frigidissimae quemadmodum ait Galenus. Nam uirtutes sensitiuae non sunt prorsus materiales, & omnino alterabiles alteratione manifesta ab ipsis sensatis propterea quod ipsae uirtutes non sunt coniunctae materiae forti coniunctione. Medicina uero ipsae materiales sunt, & materialiter cum alteratione manifesta corpus alterant, & transmutant per contraria. Necesse igitur est aliter dicere, & imaginari contraria esse simul, quamuis per similitudinem, non nimis propinquam, sicut extrema dicuntur esse in medio, ut puta album, & nigrum in colore citrino. aliter enim unum contrariorum alterum uinceret. eodem modo dici potest de medicina composita compositione artificiali. eius enim operatio similiter est secundum contraria in ipsa existentia medio illo modo inter potentiam, & actum siquidem medicina ipse est unum inesse artificiali, sicut medicina simplex est unum inesse naturali, & quod dicitur de primis qualitatibus intelligi debet etiam de secundis. Possunt enim commisceri, ita ut uirtus quaedam habitualis nascatur media inter uirtutes ipsorum componentium, & medici quidem debuissent de hac dicere sicuti dixerunt de qualitatibus primis, & non imaginari naturam ad se trahere illam partem quae est magis conueniens, & magis necessaria. si enim in medicina non reperiantur uirtutes contrariae, quomodo potest natura ad se trahere alteram tanquam magis conuenientem uni membro & nisi alteram ipsarum tanquam magis conuenientem alteri membro, nisi diceretur, quod tam in qualitatibus primis, quam in uirtutibus secundis, cum contraria miscetur, fit quoddam medium utrunque extremorum habitualiter utrunque continens, & cum tale compositum sumitur a corpore humano per actionem caloris humani corporis separantur & resoluuntur partes, quae erant

in ipsa medicina composita eo modo, quo mixtum resoluitur  
in elementa, quæ deinde habent actu suas qualitates. Et si qui-  
dem artificio hoc fieri potest in misto uni formi, sicut de lacte  
Auerrois concedit multo magis per actionem caloris natura-  
lis. Et hoc forte intellexerunt medici, non autem quod ipsa me-  
dicina composita sint contraria actu. Si compositum factum  
est unum per artificio, hoc autem modo sensisse medicos pro-  
babiliter nobis persuadere possumus eo, quod confiteantur in  
medicina composita inueniri proprietatem, quæ consequitur  
totam substantiam, & non est alicuius partium componētium,  
sicut de theriaca uult Auicēna, quod maior pars operationum  
theriace prouenit a proprietate consequēte totam substantiam.  
Manifestum igitur est, quod proprietates componentium ip-  
sam refranguntur in proprietatem illam, & non est remotum a  
probabilitate, quod theriaca assumpta per calorem resoluitur in  
partes quarum una quæque habeat propriam uirtutem, & a me-  
bris, quibus conferuntur attrahantur. Nisi forte dicat Auerrois  
quod medicina proprium est agere, & non pati a corpore, hoc  
enim est cibi, quatenus est cibus. Et ideo non potest medicina a  
calore corporis in suas partes resolui, quæ propriam deinde ha-  
beant qualitatem. Sed quicquid de hoc sit, satis est medicis uel  
proprietatem consequentem totam substantiam agere conue-  
nientia pluribus membris, uel a calore naturali medicinam cō-  
positam resolui, & sic agere ipsum corpus humanum, nō agit  
enim medicina, nisi calore naturali fuerit actuatā, & per hæc par-  
ter responso ad utraq; difficultatum,

Caput nonum, quare qualitas medicinae non sic habeat ad  
qualitatem corporis humani, sicut ad qualitatem consimilem  
alterius medicinae.

¶ Nulla parte tractat<sup>9</sup> hic noster uideatur diminutus,  
& mancus perquirendū restat, an ueget<sup>9</sup> sit, qđ eo dē  
modo habeant medicinā intendere uel remittere  
nostri corporis qualitatem, sicut in prædictis mon  
strauimus, quod una medicina respectu alterius ha  
bet hoc agere. Nam uidein<sup>9</sup> quod si homo habeat ægritudinē  
in quarto gradu, uel etiam in tercio, & dederimus rem calidam,  
in secundo gradu ab ea manifeste læditur, sicut a melle qui cau  
sonem patitur proculdubio læditur. ecōtrario patiens morbū  
frigidissimum in capite lædetur per unctionem olei rosati, cum  
tamen prædicti morbi per applicationem mellis uel olei debe  
rent remitti. Ad hoc autem dicendum, quod regimē curantiū,  
fit per contraria in gradu & forma, quæ autem sunt eiusdem for  
mæ potius habent intendere qualitatem quam remittere, pro  
pterea quod calor naturalis est in actu, cum calore præter natu  
rali, & qualitatem habitualement medicinā potest ad se conuertere,  
secus autem cum alteri medicinæ habēti qualitatem habitua  
lem, coniungitur, & illa non est apta conuertere, & forte quia in  
corpore est multitudo formæ caliditatis, & propterea præpara  
tio corporum est talis, quod de sui natura est apta conuertere  
omnia ad consimilem qualitatem quantūcūq; fuerint remis  
sa in simili qualitate, & ideo cōtingit quod mellis caliditas, quæ  
est infra caliditatem causonis, & quæ de se remitteret illam po  
tius intendat, & lædat neque hoc est in conueniens in his febris  
bus. A qua etiā cucumeris, quæ est frigidissima cōuertitur ad co  
leram maxime cum morbus hic fuerit in iuuenibus propter for  
titudinem caloris extranei secus autem ubi non sit extra latitu  
dinem sanitatis, nam tunc medicina oppositæ complexionis  
corpori potest illam remittere, & si etiam morbus fuerit in se  
ne, non ita poterit eius caliditas medicinam cuiuscūque qua  
litis conuertere ad igneitatē, sicut in iuene, & non est pos

sibile, ut tanta sit elongatio caloris senis a suo calore naturali  
sicut iuuenis. nam si hoc esset proculdubio esset necessariū, qđ  
per opposita tanti gradus esset eorum cura quēadmodum in  
cura iuuenis cum simili morbo laborantis. Sed hoc est impossi-  
bile. nam senex patiens causonem propter membrorum radi-  
calium frigiditatem cum febrem calidissimam patiuntur suffi-  
ciunt eis medicīe frigidae in secundo gradu. & rursus si seni ad-  
hibeantur medicīe frigidae ultra complexionē suā naturalem  
proculdubio ab eis lædētur. Secus uero iuuenibus profunt, eo  
quod eorum uirtus est fortis ad eas permutandas. Et propterea  
errauerunt medici inquit Auerois absolute enunciantes quod  
quando complexio, aer, tempus anni & similia cum ægritudi-  
ne conueniunt tunc non est egressa complexio a propria na-  
tura nimio exitu & poterit curari cum rebus in qualitate oppo-  
sita remissis, secus uero ubi complexio tempus anni, & aer ab  
ægritudine dissentiant. Sed tamen hoc apparet falsum. iuuenis  
enim patiens causonem, cum prædictis omnibus conditioni-  
bus, non potest curari cum rebus remissæ frigiditatis, sed solum  
cum rebus intensæ frigiditatis, quæ si seni causonizanti propi-  
nentur eius calor proculdubio extinguetur, ratio autem est,  
quia esto quod uterque causonem patiatur, & senex & iuuenis,  
tamen caliditas senis non est tanta quanta est iuuenis in extra-  
neitate, quia minori calore est manifesta. si uero intenderetur  
calor senis in extraneitate proculdubio tenderet ad perniciem  
Decepti igitur sunt ponentes eundem gradum elongationis in  
sene & in iuuenis quare, &c.

Caput decimum & ultimum, quare medicina debilioris uirtutis non semper deprimat fortio- rem respectu corporis humani.

Ostremo aduertendum est diligenter, & attendendum, quod nō nunquam respectu corporis humani medicina debilioris uirtutis eā quæ fortioris uirtutis est, nō debilitat, imo potius fortificat, sicut acetū adiunctum medicinis calidis eas adiuuat propter apertionem, quāuis acetum respectu earum uideatur esse frigidum, quod tamen tangit ratione caliditatis. nam separata ab eo caliditate non ageret id, quod cum caliditate agit frangendo lapidem, forte etiam eius stipticitas retinendo medicinas calidas ne uelociter pertranscant earum operationem intendere uideatur, & forte hoc contingit propter assimilationem ipsarum medicinarum ad corpus humanum magis addita medicina debili medicinæ forti, quam per medicinam fortem tantū. quia nō solum per medicinam fortio- rem contingit uirtutē alicuius medicinæ intendere, sed etiam per medicinam minus fortem. Et nonnulli dicunt quod experientia compertum est, quod uirtutes secundæ fortificatur cum medicina alia simili in eodem gradu, & hoc maxime quando quantitas unius quantitati alterius fuerit æqualis, sicut patet, quod semen apii coniunctum semini melonis est fortioris uirtutis quam semen apii solum, & hæc præparatio inuenitur in compositionibus antiquorum qui laudauerunt illas medicinas, quarum secundæ uirtutes se inuicem adiuuant, quāuis in primis sint contrariæ, sed tamē dicere possumus, quod non sunt ueræ similes in uirtutibus secundis, quæ absolute similes iudicatur, propterea quod impossibile est, quod prædictæ medicinæ non diuersificentur in subtilitate substantiæ, & in grossicie, in spissitudine, & raritate, quare necessario natura in transmutatione earum non æqualiter habebit. Et ab ipsis inuicem iunctis corpus magis permutabitur propterea quod illud quod uelociter corpus egrederetur propter suæ substantiæ sub-


tilitatem retinetur ab ea, quod est tradi exitus, & hoc potest esse ratio fortificationis tam ab æquali quam ab ea, quæ debilioris existit uirtutis. Quantum tamen sit ex parte qualitatum solū modo medicina superioris gradus habet inferiorem eleuare in gradū superiorem. Et hoc modo intelligenda sunt omnia, quæ prædeterminauimus, & hoc modo haberi poterit complexio medicinæ cuiuscūq; compositæ complexione uero habita non est difficile eius dosim inuenire propterea, quod & maxima, & minima dosis secundum gradum complexionis attenditur, & si quæ diuersitas dosis reperitur in medicinis eiusdem gradus, ea contingit propter aliquid additum gradui, si cut diuersitas substantiæ stipticitas, & alia huiusmodi. Et sic præsens tractatus cum dei gratia terminat.


FINIS.

A B C D E F G Omnes sunt quaterni.

Venetis. M. cccc. lxxxvii.







531440531 N<sup>o</sup>c.

5305727204 - N<sup>o</sup>ejmp.

