

MSS (7)
Reuma

1800

Observador — Sr. Sarrais
Censor — Sr. Costa.

87-2-A = nº 5

N. 365 y 366



(25)

[Faint, illegible handwriting]



(22)

155 (A)

Real Colegio de Niños de San Carlos. L.º V.º N.º II.
de San Carlos.

En la Censura que en sumario complica
do leida por D. Ramon Saxais en

Mañ. 17 de Abril de 1800.

La censura por el Sr. Corta en 24 de
Abril del m.º



n.º 21.

87-4-A = n.º 5

N.º 365

[Faint, illegible handwriting at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]





En 31 de Mayo de 1798 se presentó en la sala de S.^{ra} Tadeo un sujeto de 25 años de edad, innitible, soltero, y de oficio tallista; de estatura alta y delgada, sujeto a resfriados, y toses, las q.^{as} se venificaban fácilmente, y en especial por las dos primaveras. La tos reca en el principio, pasaba a húmeda, pero desaparecía con algunos días de cama, y sudando a beneficio de baños de agua de malva.

El día 20 de Abril del propio año le atacaron, estando en su trabajo, unos fuertes calosfríos, q.^{as} le obligaron a meterse en cama. El día siguiente le sucedió lo mismo con bastante inquietud, por lo q.^{ue} se vio precisado a retirarse a su abitacion algo distante del sitio de su trabajo, aung.^{ue} con suma dificultad ocasionada por un dolor muy fuerte y pesader en las pier-

nas. Despues de acostado, le acometió un grande dolor de cabeza acompañado de un molesterimo ardor; de todo lo qual se alivio mediante caldos á menudo, y vasos de limon: á esto se siguió una tos guttural q. dió principio á las 12 de la noche, q. se suavizaba tomando buches de agua, y desarropandose un poco; pero q. luego repetia, burlandose del plan invinado; hasta q. el 25 del mismo mes se le hicieron dos sangrias en dos dias consecutivos, suministrandole al mismo tpo algun vaso de emulsion comun. Desp. de la segunda evacuacion, sintió un peso grande hacia el hypochondrio derecho, q. le molestaba muchisimo al querer volverse hacia qualquier lado.

El facultativo le mando se levantase, lo q. no podia conseguir sin trabajo bastante, experimentando en lugar de peso, un fuerte dolor desde el ombligo hasta el

estomago. Otro Profesor llamado para cui-
dar del enfermo ordenó una punga, cu-
ya composicion ignoro, con la qual se
facilitaron mhas evacuaciones de vi-
entre, quedando el infeliz muy debi-
litado, para lo q. contribuyó bastan-
te, sin duda, el metodo anterior de
sangria, y agua de limon.

En esta disposicion le mandaron
hacer exercicio, q. le fue muy moles-
to, obligandole a sentarse con frequen-
cia. Se le detubo en parte la orina,
se hallaba con la misma pesader y
dolor, se le hincharon las extremidades
inferiores, y el vientre, pero comia
y dormia regularmente á pesar de todo
esto.

Los Panientes y vecinos se juntaron
con auctoridad, para tomar sus dispo-
siciones, y figurandose q. el mal po-
dia proceder de algun asiento, le

aplicaron en la region del estomago, ca-
tapsas muy compuestas de panietania,
cebollas á medio cocer, y otras hierbas,
á las q. cedio la hincharon muy poco.

Llamaron segunda vez al medico, q.
dixuso una cantanida aplicada á la
tetilla derecha, y agua emetinada, y
otra con nitro, lo q. le hizo obrar bas-
tante. Los dolores le molestaban mucho,
e impedian considerablem. su descanso,
obligandole á moverse de un lado á otro
de su cama.

Se detubo con este methodo el pro-
greso de la hincharon de vientre por
entonces. Orinaba mejor, pero con un
sedimento amarillo-roxo como ladrillo.
Se notó desp. un aumento de dha hincha-
ron en las piernas y muslos, hasta la
mitad del ep. apareciendo fluctuacion
de un licor en el vientre ya muy ab-
ultado; de modo q. las cortillas falsas se

dilataron mto hacia afuera. Respiraba con alguna dificultad; no podia estar sentado, sino muy inclinado hacia atrás; el vientre lo tenia muy dolorido; más, por las tardes, y seguia un periodo desde la nochecer hasta la madrugada; haciendose mas sensible en las mutaciones de la atmospherá: pasaba malas noches; tenia detencion de orina, y heces bastante tos, y mucha tirantez de vientre.

Esto supuesto no tube reparo en llamar á la enfermedad grál afeccion Rheumatica, q.º vanio de aspectos á proporcion q.º se siguió un plan nada analogo á la complexion del sujeto: el ardor y dolor de cabeza, la tos, el peso, y dolores de la region epigástrica grálmente dependieron de un mismo agente, las modificaciones de este de las partes q.º atacó, y la hipoqueria fué una dependencia, ó si se quiere un producto del estímulo Rheuma-

tics puesto en las partes contenidas
del abdomen. Quiza pasara esta de-
cision en el concepto de algunos, por me-
ra conjetura, pero sigamos la historia,
tomando los puntos principales q. nos ofrece,
porq. si no nos extendieramos, pasando
de los limites señalados en una obser-
vacion.

Desde el dia, pues, q. entro en el Hos-
pital nro enfermo, tenia todas las no-
ches recargamiento de dolores y calentura,
pasandolas regularmente en vigilia, excep-
to aq. en q. tomaba calmantes, q. se le
administraron en varias formas, porq.
se atendia al mismo tpo a las com-
plicaciones del dolor, y entre otras a
la falta de secreciones, y a la debili-
dad, con q. se nos presento desde su
entrada en ntra Clinica. Acompa-
naba a estos syntomas el q. queda-
ba el pulso en las 24 horas siempre
febril, mas o menos acelerado, aunque
no correspondia el calor, sino en la hora

de la accesion.

Emperamos nro plan de curacion dando de beber á nuestro hydropico, acompañando las pildoras siguientes: Rj. pulveris ipecac. gr. viij, tantano triturado ℞ss, extracto gomoso de opio gr. ij; para quatro tomas, dos veces al dia; á la segunda se excitó la nausea, y alguna deposicion fecal dura; quedandose sin tos, y poca sed. Al segundo dia durmió algunos ratos, no permitiendofelo, por mas tiempo, como la noche anterior la tiranter del abdomen. La orina se ha facilitado bastante; y desde esta noche Emperó á sudar, verificandose en seguida casi toda ella, y emperando á la madrugada al declinar el periodo de los dolores, regularmente. Sin embargo de q. se podia esperar algun alivio notable en la hydropesia, y dolores; á pesar q. se tubo cuidado de facilitar el vientre, q. se

le procuró en lo demás un regimen
análogo al estímulo Rheumático, con
impresión inflamatoria en la cavi-
dad del vientre, ó partes contenidas,
sin olvidarnos de unturas, y enemas de
diversas facultades, se mantuvo la
hinchazón, y no cedió hasta q. se le
administró el mercurio dulce con
el extracto aguoso de opio, ^{dos} ^{1^{os}} granos del
primero, y uno del segundo, q. se re-
pitó algunas tres veces en diferentes
dias, dexando dos ó tres de intervalos.
Con este remedio calmante y pur-
gante al mismo tiempo, q. evacuó la
heces duras, mucosidades, ^{1^o} ^{2^o} q. se halla
tenaz dentro de los intestinos, soltó
el paciente gran cantidad de excre-
mentos caprino, con mucha mucosidad,
á lo qual siguieron otros vitiosos de colo-
res entre blancos, amañillo, y verde;
el blanco se parecia al sedimento q.
q. se experimentó desde el dia 10 y an-

tes q.^o tomase las píldoras mercuriales
calmantes; el qual inspeccionado con
cuidado ena un puz sin duda produci-
do donde estaban los dolores fixos en
la region insinuada, los quales repe-
tian por las noches, sin embargo de
haberse verificado la supuracion, q.^o
parecio, debia haber tomado otra for-
ma.

Desde esta soltura de vientre se cono-
cio' disminuirse la elevacion del abdomen
y parte inferior del pecho. El dia 21 de Ju-
nio se le administro por la noche, dos
dracmas de warave de meconio, con dos on-
zas de agua de stonbergit; y enema
anodina segun el formulario del Hos-
pital, con el finde mitigar los dolores,
q.^o aquel dia molestaban vehementemente
al enfermo: al dia siguiente
solto vixisimo el vientre, y aya de la
abundancia de los materiales evacuados,
salio mucha ventosidad, resultando de todo
el baxarse mas y mas la grand mole q.^o

presentaba la ascitis, y pro porcional-
mente el ascroto, y muslos q.^o llegaron
a hincharse alternativamente; de
cuenta q.^o el 28 del mismo mes lle-
garon en su estado natural. A este tpo
empeso a sentir dolores desde las in-
gles a los tobillos, con sudor a la madru-
gada; repitiendo aquellos cada noche,
y este al amanecer, haciendose general
algunos dias; pero quedandose, entera-
mente enjuto de las extremidades in-
feriores.

La pro porcion habia disminuido la
barriga, y el sedimento punulento, pero
sin ceder el periodo del dolor nocturno,
aunq.^o bastante remitido en el 31 de dho
mes.

En el dia 3 de julio molestanon alem-
fennos fuertes dolores al muslo y pier-
na izquierda, la orina eno natural en
bastante cantidad, y el vientro regular-
mente.

Dia 6, tomo dos granos de hypericua-
na, con tres de mercurio dulce, con lo

que obró muchísimo, siguiendo con el mis-
mo remedio un día sí, y otro no, y se con-
exacuación de vientre, algunos conatos á
vomitar, quedando aquel bastante laxo,
y sin necesitar de atender á esta eva-
cuación; pero no se olvidaron las fuer-
zas, para cuyo mantenimiento tenia
su correspondiente plan, q. las conservo
regularmente, á pesar de las grandes eva-
cuaciones q. habían precedido, de modo
q. jamás las he observado tan copiosas, de
colores tan variados, y tan fetidas.

El día 18 se levanto, quedando algunos
material dentro del abdomen: siguió al-
gunos días sin novedad, hasta q. el 28
día bastante fresco, sentándose en la
~~puerta de la ciudad~~ de la sala por la tarde, nullo
un resfriado, causa de la repetición de
los dolores primarios, calentura, hin-
charse de vientre, y alguna dificultad
en la respiración. Volvimos en con-
secuencia á establecer un plan según lo
pidieron las circunstancias, empleando
varios remedios con alivio pasageros,
pero la respiración fue definitivamente

alacandoso, siendo cada dia mayor, la tachea se iba dilatando mayor y mayor modo q. q. los 5 o 6 dias ultimos parecia salir a recibir al ayre, a defecto de no penetrar al pulmon, munito finalmente este infeliz, presentando mayor bien q. otra cosa syntomas de estas a tacaos ag. viciada quina del ayre fresco, y su poca cantidad q. le ocasionaron el resfriado, buslandose de todos los medios q. empleamos para su conservacion.

Inspeccionado el cadaver, se halló en la cavidad del abdomen una porcion de agua sanguinolenta; color livido en los intestinos delgados, y peritonos, no correspondiendo en ag. a toda su extension, notandose en ellos estar ademas adheridos, y unidos con otros, y mas gruesos de lo q. corresponde a su estado natural; y el higado adherido por su lobulo inferior al intestino color, y por su parte convexa al diafragma.

Levantado el estomago, se observó la cavidad virgineada llena de serosi-

dad sanguinolenta, semejante a la
del vientre; el pulmón de este lado re-
ducido a un tercio escaso de su volumen
natural, y el derecho la mitad menor,
adenidos, este al diafragma, y aquel a la
pleura; en la circunferencia de los bron-
quios muchas glandulas tuberculosas, los
anillos de los mismos muy gruesos,
y lo mismo el pericardio y mediastino,
con una dureza puesternatural. se ha-
lló finalmente muy pequeño el corazón.

Convenia, Señores, q. se
leyeran muy amenudo observaciones
de sujetos q. murieron, pudiendose
presentar al mismo tpo la ins-
peccion del cadaver. Regularmente
escogemos lo q. se acomoda mas a nro
modo de pensar, y por lo regular ade-
quando a ciertos casos enq. el Profe-
sor se considera vencedor, aunq. no
siempre contribuye con las reglas
mas sanas de su facultad. Pintamos
la historia, y llenamos el papel de
ingenio, y determinaciones, quando no

Pocas veces, obramos llenos de dudas,
resolvemos con poco conocimiento,
y callamos los defectos q. cometemos,
resultando una historia de una en-
fermedad q. se ha curado, aung.
no siempre comprehendemos el mo-
tibo de esta felicidad.

El caso de mi observacion me
presentaba una historia larguissi-
ma desde el 3^o de Mayo hasta el 25
de Septiembre, pidio una atencion
particular, ocurrieron diversos
syntomas, y diferentes grados, y tu-
vimos lugar y ocasion de modificar
nuestro plan, aung. nunca le varia-
mos en toda su extension. Un a-
gente Rheumatico, una supuracion,
la ascitis ~~y~~ anasarca, y la debilidad,
Venon fundam^{to} para las indicacio-
nes q. se tomaron, hasta q. el res-
friado aumento los dolores q. apenas
habian cesado del todo; volviase a re-
llenar el vientre; luego los syntho-

may del thorax motivaron otras in-
dicaciones, q^d no se llenaron con todo
el conocimiento q^d se deseaba; la di-
ficultad de respirar fue el may agra-
vado. Se conocia q^e el ayre no pene-
traba dentro de los conductos aereos
con libertad: a proporcion se fue ob-
servando una dilataⁿ y contraccion
de la trachea, q^e seguian los movi-
mientos de inspiraⁿ y espiracion,
q^d se fueron aumentando a tal pun-
to q^d se advertia un esfuerzo de la
naturalera, para dar paso al ayre,
ya q^d no podian dilatarse los pulmo-
nes. Un movimiento semejante se
observa en las enfermedades agudas,
aproximandose la muerte, quando
los pulmones caen en una debili-
dad q^d es quasi paralytica; raris-
simam^e escapan los pacientes de las
garras de la muerte, por q^d los pul-
mones se van achatando, y el ayre
va entrando a proporcion con may
dificultad.

En el mismo caso q. nos ocupa se
verificaron sudores q. rarissima vez
se ven, estando presente la ascitis
y anasarca. Siempre se ha deseado
y creído muy útiles; fundandose, en
gran parte, la dificultad de su cura-
cion en su defecto; mas nosotros los vi-
mos y tocamos, siguiendo por las man-
nas las remisiones de los paroxismos,
y sin alivio conocido, hasta q. con el
mercurio se excitaban grandes esa-
cuaciones fetidísimas, y variadas en
el color; en efecto el Hg mercurio ade-
mas de su virtud pungante, es un
excitante de los absorbentes al mis-
mo tiempo.

En ninguna de las dos cavida-
des observamos úlceras, ni señales
de inflamacion, y de consiguiente el
pus dependio de las superficies infla-
madas, del mismo modo q. las ad-
rencias, q. consistian en una union
de superficies sin medio organizado,
sino con una materia q. hace

oficios de cola, como se suele observar de ~~estas~~
resultar de inflamaciones crónicas hemi-
hemisipeláticas, como lo fue la del caso
presente.

La senosidad sanguinolenta se
presenta muchas veces en caso
de supuraciones internas, acompa-
ñada de derrames senosos.

La fetidez tan fastidiosa se atribuye
a la inflamación; lo mismo
sucede en la q^a proviene de intesti-
no estrangulado.

Finalm^{te}. no se halló pus en la cavi-
dad del pecho, ni del vientre, en esta
parte práctmte, donde se radicó la
inflamación, y sin duda dio motivo
a la formación del pus, q^e salió por
la camara yonina. Quizá si no
se hubiera complicado la enferme-
dad en los pulmones, se hubiera curado
una hydropesia, purulenta - serosa
con inflamación, según se presen-
taba el caso, antes de la fatal época

para el paciente de la renovación
de su tragico padecen, y se tendria
sin duda una observacion q. en su
especie no es comun

Nota. Esta observacion es de J. Ramo
Larrai; y no firmó p. un docto.



1851

Received of the Hon. Secy of the Navy

the sum of \$1000

for the purchase of the

U.S.S. Albatross

for the service of the

U.S. Navy

for the service of the


U.S. Navy

for the service of the

U.S. Navy

for the service of the

U.S. Navy



Año 1800. L. V. N.º 12

Censura leyda por D. Rafael Corta
En 24 de Abril.



87-4-A = n.º 5.

N.º 366

Faint, illegible handwriting at the top of the page.

Faint, illegible handwriting in the upper middle section.

Faint, illegible handwriting in the middle section.



Faint, illegible handwriting in the lower middle section.

Faint, illegible handwriting at the bottom left of the page.



En el jueves proximo pasado leyo el Sr. D.^o Ramon Sana-
is una observacion cuyo tenor en resumen es el sig.^{te}

Un sujeto de 25 años de edad, inmitable, soltero, de
oficio tallista, de estatura alta y delgada, y muy pro-
pense en las dos primaveras con particularidad á to-
ser q.^o al fin eran humedas y q.^o desaparecian facilm.^{te}
á beneficio de sudor el qual conseguia mediante algu-
nos dias de cama, y la bebida de agua de malvas, fue
acometido en 20 de Abril de 1798 de calofrios q.^o le obli-
garon á meterse en la cama, y repitieron al otro dia
con inquietud, dolor y pesadez de piernas y de cabeza todo
con ardor. Se disminuyeron algo estas molestias á favor
de sudor calido y de hemorragias, pero el alivio fue para-
gero, pues á las doce de la noche sobrevino tor gutural
q.^o no obstante de suavizarse por medio de buches de
agua, y de aligerarse la ropa de la cama, fue continua-
do. Se creia conveniente prescribia una emulsion co-
mun, y sangrar dos veces al enfermo en dos dias con-
secutivos, y se logro la disminucion de la tor. Despues
de la segunda evacuacion sobrevino un peso gran-
de ácia el hipocondrio derecho que molestaba mu-
chissimo á nuestro enfermo al volverse de uno y
de otro lado.

No obstante esta incomodidad mandó el Facultativo

q.^o le arístia, que se levantare, lo q.^o executò el Paciente
 aung.^o con sumo trabajo experimentando en lugar de
 pero un fuerte dolor desde el ombliço hasta el Estomago.
 Esta incomodidad, y las repetidas evacuaciones de vien-
 tre q.^o movió una purga prescrita por aquel, aumen-
 taron la debilidad q.^o habia ocasionado la enfermedad
 y el mal metodo curativo, y sin embargo de q.^o el enfermo
 apenas podia andar se le obligo à hacer exercicio. So-
 bre vino alguna retencion de orina, é hincharon en las
 extremidades inferiores y en el vientre, y reuadeciò la pe-
 sader y el dolor; no obstante el sueño, y el hambre eran
 regulares.

Creyeron los Pacientes y vecinos q.^o la enferme-
 dad procedía de un ariento, y se adelantaron en apli-
 car en la region del estomago cataplasmas compues-
 tas de parietaria, de cebollas à medio cocer, y de otras
 yerbas à cuyo beneficio cedió la hincharon del vien-
 tre muy poco; pero los dolores tomaron tal increm.^{to}
 q.^o el Paciente no se regaba un momento en todo el dia.
 Con motivo de esta novedad llamaron por segunda
 vez al Medico, quien ordenò una agua emetivada,
 otra con nítro apasto y q.^o se aplicase un parche de
 cantaridas en la tetilla derecha, con estos auxilios
 se lograron abundantes evacuaciones de vientre;

3

se suspendió el progreso del la hinchazon de esta cavidad; y se facilitó la cacreacion de la orina, la qual ofrece un sedimento verdaderam^{te}. laticicio. Pero durò poco esta mejoría, pues al cabo de pocos días se hincharon considerablem^{te} las extremidades inferiores y la mitad inferior del tronco; y se manifestó fluctuacion decidida en el vientre. Ademas nuestro enfermo respiraba con alguna dificultad y casi le faltaba la respiracion estando sentado, si no se inclinaba mucho acia atrás; su vientre se ponía mas dolorido desde el anochecer hasta la madrugada, periódicam^{te}; incomodidad, q^e se aumentaba mas en ciertas mutaciones de la atmósfera; la tos y tianter de vientre eran de bastante consideracion, y difícil la excrecion de las heces, y de la orina. En este estado se hallaba nuestro enfermo en el día 31 de Mayo del citado año, y fue el primero en q^e le vió el observador en la sala de S^{ra}. Judas Tades.

Hecho cargo el observador de quanto viene expresado se persuadió q^e el agente de tantos sintomas era reumatico, q^e la variacion de aspecto con q^e se presentó el mal era debido á q^e el metodo con q^e se socorrio no era correspond^{te} á la complexion del sujeto y q^e la hidropesia fue tambien efecto del agente mencionado. Y para q^e no parezca libre esta decision ofrece el observador justificado

con reflexiones hechas sobre los puntos principales del mal.

El pulso siempre era febril pero el calor no correspondía á su aceleración sino en el tiempo de la exacerbación, y el enfermo paraba regularmente las noches en claro, sino quando tomaba algun medicam^{to}. calmante q^e. se le administrò bajo varias formas no solo para conciliarle el sueño sino tambien para atender á la debilidad y al dolor, y para facilitar las secreciones. Se empezó el plan de curación dando de beber al enfermo y dos tomas por día de la siguiente receta ℞. de polvor de ipecacuana gr. viij. de tartar. vitriolado ℥. de extracto gomoso de opio gr. ij. mezclese para quatro tomas. La segunda de estas tomas ocasionó nausea y alguna deposición fecal dura, desapareció la tos, y se disminuyó mucho la sed. El día sig^{te} durmió el Paciente algunos ratos interceptados por la molestia de la tirantez del vientre, y desde esta noche empezó á sudar en las remisiones de la calentura (evacuación que repitió casi todos los días en lo sucesivo), y orinó bastante. Parece q^e. á cote sudor debia seguirse alguna calma en los dolores, y q^e. habia de suceder alguna disminución de la hinchazon mayormente habiendose facilita-

do las excreciones, y procurado un regimen análogo al estímulo reumático con impresión inflamatoria en las partes contenidas ó en las paredes del vientre, sin perder de vista varias especies de unturas, y de lavativas; pero no cedió la hinchazon hasta q.^o se recetó un grano de extracto gomoso de opio con diez de mercurio dulce para una dosis, y la tomó el Paciente unas tres veces dejando entre medias dos ó tres días; En efecto á favor de esta composicion calmte y evacuante al mismo tiempo de las heces duras, de las mucosidades, y de las materias teraceas contenidas en los intestinos soltó el vientre gran cantidad de excrementos caprino con mucha mucosidad, á q.^o siguiéron varias deposiciones biliosas de color ya blanco ya amarillo ya verde. El humor blanco era semejante al redim.^{to} q.^o desde el primer día y hasta el enq.^o obró la composicion referida presentaba la úlcera; é inspeccionado con cuidado era podre producida sin duda en la parte donde se habian fixado los dolores los quales tenian su crecim.^{to} como antes y en la misma forma, pero se disminuyó el volumen del vientre.

Para mitigar los dolores q.^o eran vehementes el día 21. de Julio contempló util nuestro Observador recetando dos dragmas del Maxave de meconio con dos onzas del

agua de Torongil, y una lavativa anodina, por cuyo me-
 dio se desocupó el vientre de muchísimo excremento,
 y materias acrisiformes, y en consecuencia se fue ba-
 xando el vientre, y disminuyendo, proporcionalm^{te} la
 semi-amaraaca, la qual el día 28. se habia quitado del
 todo, y se le substituyeron dolores desde las ingles has-
 ta los tobillos. Continuaba à las mismas horas el sudor
 q^o algunas veces era general, y à proporción dimi-
 nuia el volumen de la barriga y el sedim^{to} puulento
 de la orina.

En el día 30 se habia calmado bastante el dolor pe-
 riodico, y repitió con vehemencia el día 3. de Julio el
 de las extremidades, en qual época era natural y bas-
 tante copiosa la orina, y el vientre no tenía mas volu-
 men del q^o le correspondia.

En el día 6. tomó el paciente dos granos de ipecacuan-
 aha con tres de mercurio dulce, y siguió tomando
 esta composición un día si y otro no hasta el día 28
 en q^o se levantó, y quedaba aún q^o evacuar el vien-
 tre no obstante de haber precedido evacuaciones q^o
 el observador no habia hasta entonces observado tan
 copiosas, tan fetidas, y de tanta variedad de colores.
 A todo esto no acompañaba la debilidad q^o à primera vi-
 sta se representará qualquiera q^o atienda à las eva-

cuaciones; pues el observador procura muy desde el principio la conservación de las fuerzas.

El día en q.^o se levantó nuestro enfermo era fresco, y habiendole sentado sin precaución á la corriente del aire se le afectó el pecho, y murio al fin apesar de q.^o se examinó muchísimo el observador para impedir el progreso de este nuevo mal.

Paró el observador á inspeccionar el cadáver, y en el vientre halló una porcion de agua sanguinolenta derramada, y ademas notó q.^o el higado estaba adherido al diafragma, y al intestino colon, q.^o los intestinos delgado lo estaban entre si y con el peritonreo, y que estos tubos habian adquirido mayor espesor y q.^o lo mismo que el peritonreo se hallaban como salpicados de manchas lividas.

El hipocondrio vital irguiendo se hallaba ocupado de una serosidad analogá á la derramada en el vientre; los pulmones se habian reducido á menor volumen de suerte q.^o el irguiendo habia perdido dos tercios, y el derecho la mitad; ambos se presentaron adheridos el 1.^o á la pleura, y el segundo al diafragma, el corazón era tambien muy pequeño, las glandulas de los bronquios tuberculosas, y su amillo muy grueso, al paso q.^o el pericardio, y el mediastino ofrecian una durera preternatural.

En vista de todo hace el observador algunas reflexio-

mer, y empieera diciendo q.^o convendría leer con mas frecuencia observaciones de enfermedades q.^o han acabado con los enfermos, si ha habido proporcion de inspección en los cadáveres; pues el cotejo de lo ocurrido con lo q.^o se nos demuestra en la inspección nos ilumina para conocer mejor el mal y su metodo curativo en casos analogos. Quando leemos sobre curaciones felices creemos muchas veces haber conocido el mal, y habele vencido con nuevos auxilios, y nos engañamos completamente.

El plan curativo en el caso actual se dirigia contra el agente reumatico, la supuración, el ascitis, la anasarca y la debilidad; y no obstante de q.^o los sintomas se presentaron con varios aspectos no se varió, pero fue preciso modificarlo algunas veces.

A beneficio del metodo prevenido habia cedido el mal; y solo quedaba un ligero dolor q.^o el enfermo tuvo la desgracia de recaer por la impresion del aque frio, y habiendo reparado el observador que a medida q.^o se iba dificultando la respiración iba contrayendose y dilatandose mas y mas la traquea, figurando como una inspiración y expiración independientes de los pulmones, q.^o es lo q.^o suele suceder q.^o por enfermedades agudas se aplastan estos organos o han perdido conside-

rablem^{te} su reaccion, adviérte como de paso q^e está muíj
proxima la muerte, y q^e rarísima vez falta q^{do} se
verifica éste modo de respirar.

A toda hidropesia acompaña dificultad casi inven-
cible de sudar, y se cree q^e en gran parte es debida á
esta, la q^e experimentamos en curar este mal; pero
en nuestro caso no vivió de nada el sudor, y perdió
precisam^{te} el alivio de las copiosas evacuaciones de
vientre, q^e fueron promovidas entre otros remedios
por el mercurio, el qual excita al mismo tiempo los
absorventes.

En ninguna de las dos cavidades había úlceras,
solo se observaron vástos de inflamación erisipela-
tosa en el peritórreo, y en algunas de las partes con-
tenidas, adherencias de estas, y de las visceras del pe-
cho por medio inorgánica, q^e no puede ser otro el q^e
ocurre esta especie de inflamación mayormente
siendo crónica.

A las supuraciones suelen acompañar derramam^{tos} seos-
os mas ó menos sanguinolentos.

Atribuyó la causa fétida de los excrem^{tos} á la infla-
macion, y la compara con la de las materias conteni-
das en un intestino estrangulado.

Por fin salio por camara y orina la podre q^e sin duda

se formaría principalmente en el vientre donde se fijó la inflamación, pues no se encontró materia purulenta en ninguna de las dos cavidades.

Concluye el observador diciendo q^e tal vez se habría curado el enfermo si no hubiere sobrevenido el resfriado q^e determinó la muerte con agüdera, y q^e obtendríamos una curación, q^e en su especie no es común.

Dictamen

El mal cuya descripción acabo de hacer fue desde los principios muy grave, y solo baxo la dirección de un buen Profesor podía llegar á presentarse con un aspecto tan alagueno como ofrecía antes de respirarse el Enfermo. Cada una de las enfermedades subalterno era capaz de acarrear la muerte con mas ó menos prontitud, pero por el singular tino con q^e se atendió á las urgencias, y al caracter del agente morboso, q^e me persuado con el observador era de índole reumática, no solo se contaron los progresos del mal, sino q^e este cedió del todo, si exceptuamos algunos leves dolores en las extremidades. Prueba nada equívoca de lo mucho q^e puede el arte si se aplica con juicio; es decir, si por su medio se recorre á la naturaleza segun conviene; pero como muchos ^{veces} sin haber conocido la enfermedad salimos victoriosos á pesar de administrar medicam.^{tos}


44.
contraindicados es sumamente necesario para evitar en
q^{to} sea posible los errores q^e de esto se originan, hacer
inspección de los cadáveres. Este es el unico recurso por
el qual á la vista de la parte afecta, podemos cerciorar-
nos de si conocemos las enfermedades, y sus grados, y de
los productos útiles ó perniciosos de las Reacciones de la
naturaleza; ojalá que hubiera mas proporcion para
hacer semejantes reconocimientos, y q^e no se circun-
screvieran los Profesores á examinar preciam^{te} el organo cuya
afección determinó la muerte, sino q^e se entendieran
á informarse del estado de aquellas q^e en otras oca-
siones padecian, y se descartaron del todo ó en parte
de la enfermedad! Se está palpando la utilidad de
este procedim^{to} en el caso actual; recelaba el observador
que habia una supuración en el parage en q^e se habia fi-
jado el dolor, q^e por orina y camara salia podre emana-
da de aquel, y se hacia cargo del estado en q^e se hallarian
las visceras dañadas; pero sino hubiere inspeccionado
el cadaver, tal vez no se habria atrevido á afirmar
lo q^e con tanto fundam^{to} recelaba qued^{do} en consequen-
cia repultado entre las dudas el mérito de esta observa-
ción; y si hubiera tenido valor para resolver en esta
Junta segun pensaba, tal vez nosotros mismos nos ha-
biamos apartado de sus acertados conceptos. Quiric-

ra confiaman con mis otros conocimientos otras muchas reflexiones q.^e sabiam^{te} hizo el Observador, pero ellas son por si bastante claras, y mis ocupaciones no me lo permiten. Solo dire en conclusion q.^e sin embargo de ser raras, q.^e deo la inflamacion, las manchas lividas q.^e se notaron en los intestinos delgado del cada-ven citado, no por esto hemos de inferir q.^e han sido inflamados los intestinos u otra viscera siempre q.^e se adviertan en ellos semejantes manchas o q.^e parezcan como inyectados; me ha parecido del caso advertirlo a los Principiantes pues la putrida sola produce tambien estos efectos, q.^e confunden facil^{te} con los de la inflamacion, los q.^e no conocen el caracter esencial de esta.

Madrid 22 de Abril de 1800.

Rafael Cortaz
C. Quintana





[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting, possibly a signature or date.]



