


MSS 920(69)
Período nocturno
de violetas

Invierno 1881
Observación sobre una banda púrpura
transite de violetas con calida del
epíptilon.

87 2. A - m° 9

998

B.A. MSS 920 (69)



27 de Abril 1801

Nº 998

Observal. Se una herida penetrante
se Vientre con salida
del Epiplo.

En Enero de 1801 fui llamado para curar un muchacho de 15 a 16 años y de buena constitución, que se hallaba con una herida en la region Thiasa izquierda cerca de la Cresta del Hueso, hecha con un cuchillo que le tiraron a algunas varas de distancia. Reconoci la herida y observé que su longitud seria de poco mas de media pulgada, y que por ella salia una porcionilla de Epiplo del tamaño de una arellana. Procure indagar en lo posible si habia sintomas que diesen compellos de lesion en algun intestino; pero la tranquilidad del enfermo, la flexibilidad de su vientre y la carencia de dolores me fueron de muy buen ayudo, y no pense en mas que en atender a la herida. Removi un poco la porcion de Ruidoso con el seronito de reducirla al vientre respecto de hallarse sano; mas viendo que con haber de parado el Epiplo de los labios de la herida empero a salir bastante sangre desisti de mi intento y me resolví a dejarlo como estaba.

mas acertado
por parecerme que este seria el medio, de arque-
rar la curacion sin exponer al paciente a los ma-
los efectos que pudieran ^{dejarnos} requerir a la reduccion
del dedo ~~entre de poco tiempo~~, en lo sucesivo.

Tomad ya este partido se aplicaron sobre la
herida unas hilas, una compresa o cabral y pen-
daje conveniente, y al vientre una cintura em-
~~y este sangrare~~ ^{por precaucion}, y tempor-
tales ~~hasta~~ el enfermo a una dieta rigurosa,
esperando ~~si~~ que el tiempo adarare
por medio de algunos sintonas, o por la faba u otros
si el pusio que habia formado se la sacria a la
herida era tan apurado como yo me lo figuraba.

Al dia sig.^{te} halle al muchacho sin novedad
habiendose dormido toda la noche comiendo cosa
lo hubiere sucedido. Despelo sin tocarle y con
la misma dieta por tres ó cuatro dias; enton-
ces quite el aporito que se hallaba con hume-
rada suficiente para poderse despegar sin di-
ficultad, y observe que los labios de la herida
estaban poco ó nada alterados y que la porci-
onilla de Criplooon se habia reducido a menos
de la mitad de su volumen, conservando su vita-
lidad, y que el color de llamas que era antes queria
inclinarse a roxo. Apliquele de nuevo la hila
seca y un emplasto de diapalma con el resto del
aporito, y aunque el paciente sacaba de diez en
con que aplacar la hambre, siguió con su calzo,

dado en mas cantidad y mas amenuado, hasta
asegurarme mejor de que la herida no era mas
de lo que parecia. Viendo pues que mi enfermo
tenia por unica incomodidad una hambre que lo
devoraba, le concedi una sopa a la que se dia en
dia se fue agregando algun alimento mas, hasta
llegar a su racion completa.

Como el aposito, o por mejor decir, las hilas apli-
cadas sobre la herida se humedecian prouisimo,
no fu necessario removerlas en algunos dias, y
quando llegue a quitarlas, ^{notre} que los labios se hagan
rida estaban pegados a la circumferencia de la
porcion de clyiptoon a que sobre todo daban que
abrazaban; que esta sobresalio muy poco del
nivel del cutis, y que no hallandose ulcerada ni
aun escoriada sensiblemente tenia un color seme-
jante al de los tegumentos ^{aunq.} algo mas blanco.
Por ultimo. Viendo las cosas en tan buen es-
tado se volvieron a aplicar las hilas y emplastos
y al reconocer de nuevo la parte afecta, la ha-
bileza perfectamente ^{se} fana, desaparecio la emi-
nencia que formaba la porcionilla del Ombligo, el
cutis por muy igual, y la cicatriz ó la mancha
que lo parecia de colores mas claros que el resto de la
circumferencia. En una palabra Clyiptoon quedo en su estado
^{en la tercera} formando ^{lo que} parecia cicatriz.
Dijo arriba que habia dejado fuera el Crip-
toon para evitar alguna revuelta poco favorable

Reportante

que pudiera acarrear la reducción, ó en lo sucesivo.
Por el pronto ~~no~~ ^{podría} quedar
el omento ~~seguilla~~ y reunidos los recumbentes se arra-
mase una porción mas ó menos grande de hígado en
el vientre sola y ^{ocasionale} ~~los~~ motivos accidentes gra-
ves que ya he obsevado y aun la muerte como lo he visto
varias veces en heridas simples penetrantes se esta
avizora. En el caso presente había recelos muy bien
fundados, se ~~esta~~ ^{un} serrana ^{futura}, supuesto que apenas se
^{inclino} separó el omento hacia un lado de la herida, ^{de} temeroso
de salir alguna sangre; ~~que~~ ^{que} quisiera por intentar
cortado algún ramillo de los mayores de la arteria
ylicia anterior. Por lo que hace al lado que pudiera
haber en adelante, está claro que cualquier herida
penetrante de Vientre nace de un origen a una her-
nia ventral. ^{y en esta cosa} mermotivo por exhortan basta
nos por supuesto que el primer
temor fue vano y que la hernia no se verifica
siempre, i que se perdió en el caso presente en haber
expido se hacer la reducción, y que se puede aventur-
rar en otros quando la posición del omento no es
considerable. Leemos los carlistas y los que han he-
cho experimentos en animales vivos responden fuera
el epíplano, y se vera que lo conduca observada
en uno herido ^{desde} por maza hasta felicemen-
te, y exposta a los riesgos de otros procedimientos
esta observación no se presenta para dar pre-
ceptos que imitar, sino para cumplir la obligación
que se nos impone. y aunq. ^{mitivo} ella es de poco momento
no dejar de dar material ^{al} General y ^{el} instruye la ^{particular} ^{que} ventura
nervos para ilustrar la materia ^{el} particularmente. si no
se limitan a tratar solo de las heridas con poca talla
del epíplano, sino que se extienden a porciones considera-
bles con alteración ó sin ella.

8826

Observaciones y
Censuras de Dto.

John H. Smithwick
F. W. C. & Co.